

一、单选

1、我国第一所护士学校创办的时间是：

- A、 1887 年
- B、 1874 年
- C、 1888 年
- D、 1895 年

答案：C

2、护理程序的基本步骤正确的是：

- A、 评估、诊断、计划、实施、评价
- B、 诊断、评估、计划、实施、评价
- C、 评估、计划、诊断、实施、评价
- D、 评估、诊断、实施、计划、评价

答案：A

3、患者男性, 34 岁。因严重脑外伤收住院, 收集资料评估病人后, 确认存在以下健康问题, 其中应优先解决的护理问题是：

- A、 皮肤的完整性受损
- B、 有尿失禁
- C、 呼吸道阻塞
- D、 营养缺乏

答案：C

4、病人休养的适宜环境是：

- A、 儿科病室冬季室温在 22~24 ℃
- B、 产妇病室应注意保暖, 绝对不能开窗通风, 以免产妇着凉
- C、 气管切开病人室内湿度在 35 %
- D、 破伤风病人室内光线应充足

答案：A

5、铜绿假单胞菌感染的敷料应采用的处理方法是：

- A、 高压蒸汽灭菌法
- B、 消毒液浸泡法
- C、 干烤法
- D、 燃烧法

答案：D

6、为昏迷病人做口腔护理时, 特别应注意：

- A、 压舌板轻轻撑开颊部
- B、 从外向里擦净口腔及牙齿的各面
- C. 操作时动作要轻
- D. 血管钳一次只能夹一个棉球, 棉球不宜过湿

答案：D

7、口腔护理时用于治疗铜绿假单胞菌感染的常用漱口溶液是：

- A、 %过氧化氢溶液

- B、 2 %硼酸溶液
- C、 4 %碳酸氢钠溶液
- D、 0.1 %醋酸溶液

答案: D

8、呼吸和呼吸暂停交替出现称为:

- A、 陈施呼吸
- B、 间断呼吸
- C、 库斯莫呼吸
- D、 浮浅式呼吸

答案: B

9、不宜由直肠测体温的病人是:

- A、 精神异常者
- B、 昏迷者
- C、 小儿
- D、 腹泻者

答案: D

10、无尿是指 24 小时尿量少于:

- A、 100 mL
- B、 400 mL
- C、 1000 mL
- D、 1500 mL

答案: A

11、大量不保留灌肠时灌肠筒内液面距肛门的距离是:

- A、 40~50 cm
- B、 45~60 cm
- C、 40~60 cm
- D、 55~70 cm

答案: C

12、下列哪项为诊断心动过缓的脉搏次数:

- A、 <40 次/分
- B、 <50 次/分
- C、 <60 次/分
- D、 <70 次/分

答案: C

13、发挥药效最快的给药途径是:

- A、 口服
- B、 皮下注射
- C、 吸入
- D、 静脉注射

答案: D

14、可纠正体内电解质失调的溶液是:

- A、 浓缩白蛋白
- B、 右旋糖酐
- C、 血浆
- D、 晶体溶液

答案: D

15、最常见的输液反应是:

- A、 过敏反应
- B、 心脏负荷过重的反应
- C、 发热反应
- D、 空气栓塞

答案: C

16、输液引起急性循环负荷过重(肺水肿)的特征性症状是:

- A、 咳嗽、呼吸困难
- B、 心慌、恶心、呕吐
- C、 紫绀、烦躁不安
- D、 咳嗽、咳粉红色泡沫性痰、气促、胸闷

答案: D

17、输液过程中莫菲氏管内液面自行下降的原因是:

- A、 病人肢体位置不当
- B、 莫菲氏管有裂隙
- C、 针头处漏水
- D、 输液管太粗,滴速太快

答案: B

18、为病人进行鼻饲时,流质饮食的适宜温度是:

- A、 20~25 ℃
- B、 26~30 ℃
- C、 31~35 ℃
- D、 38~40 ℃

答案: D

19、为病人进行鼻饲时,胃管插入长度相当于病人的:

- A、 眉心至剑突长度
- B、 眉心至胸骨柄长度
- C、 前额发际至剑突长度
- D、 前额发际至胸骨柄长度

答案: C

20、长期鼻饲病人普通胃管更换的时间为:

- A、 每日一次

- B、 隔日一次
- C、 每周一次
- D、 每周二次

答案： C

21、预防便秘的方法应除外：

- A、 生活规律,按时排便
- B、 选择膳食纤维丰富的水果和蔬菜
- C、 术前训练床上使用便器
- D、 定时使用缓泻剂

答案： D

22、下列注射法的进针角度错误的是：

- A、 皮内注射呈 5°
- B、 皮下注射呈 50°
- C、 肌肉注射呈 90°
- D、 静脉注射呈 $15-30^{\circ}$

答案： B

23、青霉素过敏性休克出现最早的临床症状是：

- A、 面色苍白,出冷汗
- B、 头晕眼花
- C、 血压下降
- D、 胸闷气急,皮肤瘙痒

答案： D

24、对长期输液者,合理选用和保护静脉的原则是：

- A、 从粗大明显的静脉开始
- B、 从 upper 肢静脉开始
- C、 从 lower 肢静脉开始
- D、 从远端静脉开始

答案： D

25、由于输液速度过快,量过多,患者突然呼吸困难、气促、咳嗽、咯出泡沫血性痰,下列急救措施中哪项不妥：

- A、 立即停止输液
- B、 20% - 30%乙醇湿化吸氧
- C、 置左侧卧位和头低足高位
- D、 四肢轮扎

答案： C

26、心源性呼吸困难最先出现的是：

- A、 劳力性呼吸困难
- B、 夜间阵发性呼吸困难
- C、 心源性哮喘
- D、 端坐呼吸

答案: A

27、左心衰最典型的呼吸困难表现形式是:

- A、 劳力性呼吸困难
- B、 端坐呼吸
- C、 夜间阵发性呼吸困难
- D、 急性肺水肿

答案: C

28、服用洋地黄期间, 哪种离子降低最常引起中毒:

- A、 氯
- B、 钙
- C、 钠
- D、 钾

答案: D

29、有关降压用药护理, 正确的是:

- A、 可以自行增减药物
- B、 出现头晕、眼花属于正常反应
- C、 效果差可自行撤换药物
- D、 改变体位动作要慢, 避免体位性低血压发生

答案: D

30、患者, 女性, 60 岁, 因急性心肌梗死 3 小时入院, 能够使闭塞的冠脉再通的治疗是:

- A、 吗啡皮下注射
- B、 静脉给予尿激酶
- C、 利多卡因静脉注射
- D、 硝酸甘油含服

答案: B

31、咳粉红色泡沫痰提示:

- A、 肺结核
- B、 支气管扩张
- C、 肺炎
- D、 急性肺水肿

答案: D

32、患者, 男性, 75 岁, 患慢性肺源性心脏病, 近日神志恍惚, 昼睡夜醒, 今晨出现谵妄, 肌肉抽搐, 昏迷, 抢救无效死亡。其死亡主要原因是:

- A、 呼吸衰竭
- B、 心力衰竭
- C、 肺性脑病
- D、 呼吸性酸中毒

答案: C

33、患者, 女, 32 岁, 以支气管哮喘急性发作住院治疗, 护理评估时常见诱因不包括:

- A、 剧烈运动
- B、 吸入花粉
- C、 呼吸道感染
- D、 左心衰竭

答案: D

34、患者,男性,52 岁,因上消化道出血使用三腔二囊管止血,压迫 3 天后出血停止,考虑拔管。此时需留管再观察的时间是:

- A、 6 h
- B、 8 h
- C、 12 h
- D、 24 h

答案: D

35、患者,女性,32 岁,3 年来常出现左上腹痛,常在进食后疼痛,先后曾呕血 3 次,胃肠钡餐检查发现龛影,体检上腹压痛。该患者最有可能的诊断是:

- A、 慢性胃炎
- B、 胃癌
- C、 胃溃疡
- D、 肠梗阻

答案: C

36、患者,男性,50 岁,诊断原发性肝癌 4 个月,近日肝区胀痛难忍,用哪种方法减轻患者痛苦较好:

- A、 给予镇痛药物
- B、 采取放疗、化疗等综合措施
- C、 舒适环境和体位
- D、 保持较好的心理状态

答案: A

37、患者,女性,43 岁,间断发作性下腹部疼痛伴腹泻 2 年,每天排便 3~4 次,为脓血便,常有里急后重,排便后疼痛缓解。该患者最有可能的诊断是:

- A、 慢性腹泻
- B、 阿米巴肝脓肿
- C、 肠结核
- D、 溃疡性结肠炎

答案: D

38、脑血栓形成患者发病时间常在:

- A、 感染风寒时
- B、 剧烈运动时
- C、 情绪激动时
- D、 睡眠或安静时

答案: D

39、观察脑出血患者时,发现哪种情况常提示出血已止:

- A、 瞳孔先缩小后散大
- B、 意识障碍变浅

- C、 血压继续升高
- D、 呼吸不规则

答案: B

40、洋地黄中毒的病人脉搏为:

- A、 水冲脉
- B、 间歇脉
- C、 洪脉
- D、 速脉

答案: B

41、在系统性红斑狼疮的多系统损害中,发生率最高的是:

- A、 皮肤
- B、 关节
- C、 肾脏
- D、 心血管

答案: C

42、与类风湿性关节炎的活动性、严重性成正比的是:

- A、 关节疼痛
- B、 贫血
- C、 关节肿胀
- D、 类风湿因子(RF)阳性

答案: D

43、糖尿病酮症酸中毒的特征性表现是:

- A、 极度口渴
- B、 厌食恶心
- C、 呼吸加速
- D、 呼气有烂苹果味

答案: D

44、引起再生障碍性贫血最常见的药物是:

- A、 阿司匹林
- B、 保泰松
- C、 氯霉素
- D、 磺胺药

答案: C

45、特发性血小板减少性紫癜病人血小板低于多少时应绝对卧床,避免内脏出血:

- A、 $10 \times 10^9/L$
- B、 $20 \times 10^9/L$
- C、 $30 \times 10^9/L$
- D、 $40 \times 10^9/L$

答案: B

46、患者,女性,50岁,因为反复镜下血尿、蛋白尿3年入院。查体:血压180/110 mmHg,肾功能检查血肌酐升高,该患者的诊断可能是:

- A、急性肾炎
- B、急性肾盂肾炎
- C、慢性肾炎
- D、慢性肾盂肾炎

答案: C

47、某尿毒症患者,每天晨间出现恶心、呕吐,对症护理措施为:

- A、临睡勿进食、勿进水
- B、临睡吃少量点心
- C、睡前饮水1-2次
- D、晨间饮水1-2次

答案: C

48、下列关于院前救护任务的叙述正确的是:

- A、生命体征不稳定的急救病人占呼救病人的70%-80%
- B、呼救病人中10%~15%为慢性病病人
- C、病情紧急但无生命危险的急诊病人占呼救病人的10%-15%
- D、灾害救护是院前救护的经常性任务

答案: B

49、院前急救是指:

- A、急危重病人的现场救护
- B、专业救护人员到来之前的抢救
- C、急危重症伤病员进入医院前的医疗救护
- D、途中救护

答案: C

50、关于伤员的转送,下列哪项错误:

- A、对昏迷病人,应将头偏向一侧
- B、生命体征尚不稳定的病人应暂缓汽车长途转送
- C、途中严密观察病情
- D、遇有导管脱出应立即插入

答案: D

51、反映急救速度的主要客观指标是:

- A、急救中心的面积
- B、服务区域
- C、平均反应时间
- D、基本设施

答案: C

52、下列不属于急救物品的是:

- A、除颤器
- B、心电图机

- C、纤维胃镜
- D、电动洗胃机

答案: C

53、刘某,在海中游泳时不甚溺水,被送到急诊室,查体:神志不清,口流海水,呼吸微弱,心率 45 次/min,血压 90 / 60 mmHg,医生不在场,护士处理正确的是:

- A、立即呼叫医生等待医嘱
- B、立即头偏一侧,吸出口腔异物,吸氧
- C、立即胸外心脏按压
- D、立即心电监护

答案: B

54、某病人,男性,67 岁,冠心病史 20 余年,在全麻、低温体外循环下行冠脉搭桥术,术中置入桡动脉压监测管,术后进 ICU 治疗。此病人进行桡动脉监测,最大的优点是:

- A、在手术过程中,仍能监测每一心动周期的血压变化
- B、并发症少
- C、重复性好,能反复测量血压变化
- D、能设置血压的报警界限

答案: A

55、复苏中采取维持血压,低温,镇静,脱水等措施是针对:

- A、维持有效呼吸
- B、保护肾功能
- C、脑复苏
- D、处理酸中毒及水电解质紊乱

答案: C

56、气管插管时应向套囊内注空气约()ml

- A、1 - 3
- B、3 - 5
- C、5 - 7
- D、7 - 9

答案: B

57、不属于基础护理解决的问题是:

- A、饮食的护理
- B、清洁护理
- C、腹腔穿刺的护理
- D、口腔护理

答案: C

58、铺备用床的目的是:

- A、供暂离床活动的病人使用
- B、保持病室整洁
- C、便于接受麻醉后尚未清醒的病人

D. 防止皮肤并发症的发生

答案: B

59、孕妇胎膜早破,应采取的卧位是:

A、 头高足低位

B、 去枕平卧位

C、 头低足高位

D、 屈膝仰卧位

答案: C

60、穿脱隔离衣时要避免污染:

A、 腰带以下部分

B、 腰带及衣边

C、 袖子的后面

D、 衣领及里面

答案: D

61、为昏迷病人进行口腔护理时,必须准备的用物是:

A、 开口器

B、 食醋

C、 石蜡油

D、 溃疡散

答案: A

62、口腔护理的目的不包括:

A、 保持口腔清洁

B、 预防口腔感染

C、 清除口臭,增进食欲

D、 清除口腔内一切细菌

答案: D

63、患者,女性,26 岁。因发热入院 7 天,每日体温波动在 37.8 - 40 ℃,判断其热型为:

A、 间歇热

B、 弛张热

C、 波浪热

D、 稽留热

答案: B

64、为病人测血压时嘱其仰卧,使肱动脉:

A、 平第 5 肋间

B、 高于第 5 肋间

C、 与腋中线在同一水平

D、 与腋前线在同一水平

答案: C

65、乙醇擦浴后,何时为病人测量体温:

- A、 擦浴毕
- B、 擦浴后 10 分钟
- C、 擦浴后 20 分钟
- D、 擦浴后 30 分钟

答案: D

66、关于新生儿重度窒息,下述错误的是:

- A、 Apagr 评分 0-3 分
- B、 新生儿面色苍白,躯干及四肢皮肤青紫
- C、 无呼吸或仅有喘息样微弱呼吸
- D、 心跳不规则,肌张力松弛

答案: B

67、小量不保留灌肠时肛管插入直肠的深度是:

- A、 4 - 5 cm
- B、 5 - 6 cm
- C、 7 - 10 cm
- D、 10 - 12 cm

答案: C

68、正常成人安静状态下,脉搏次数一般在下列哪个范围:

- A、 40 - 60 次/分
- B、 40 - 80 次/分
- C、 60 - 80 次/分
- D、 60 - 100 次/分

答案: D

69、可提高血浆胶体渗透压,提高血压的溶液是:

- A、 5 %葡萄糖
- B、 10 %葡萄糖
- C、 0.9 %氯化钠
- D、 低分子右旋糖酐

答案: D

70、青霉素过敏性休克在抢救时首先采取的措施是:

- A、 立即通知医生抢救
- B、 静脉注射 0.1%盐酸肾上腺素 1ml
- C、 立即停药,平卧,皮下注射 0.1 %盐酸肾上腺素
- D、 立即吸氧,胸外心脏按压

答案: C

71、输液时发生静脉痉挛致滴注不畅时应:

- A、 减慢输液速度
- B、 适当更换肢体位置
- C、 局部热敷

D、降低输液瓶位置

答案：C

72、输液时滴注不畅,局部肿胀,无回血应:

A、改变针头方向

B、更换针头重新穿刺

C、抬高输液瓶位置

D、局部热敷

答案：B

73、鼻饲适应证不包括:

A、昏迷

B、口腔疾患

C、早产婴儿

D、偏食者

答案：D

74、为病人插胃管时,出现呛咳、发绀时护士应:

A、立即拔出胃管

B、嘱病人深呼吸

C、指导病人作吞咽动作

D、稍停片刻再插入

答案：A

75、病人王某,患慢性肺源性心脏病,为减轻心脏负担,饮食宜采用:

A、高蛋白

B、低脂肪

C、低盐

D、少渣

答案：C

76、与预防泌尿系结石和感染无关的护理措施是:

A、更换集尿袋时,防止尿液逆流

B、鼓励病人多饮水增加排尿量

C、鼓励病人经常变换体位

D、作间歇性引流夹管

答案：D

77、注射定位,正确的是:

A、皮内注射:前臂掌侧上段

B、皮下注射:肩峰下三指

C、臀中小肌注射:髂前上棘外侧 3 横指处

D、臀大肌注射:髂前上棘与尾骨联线外上 2 / 3

答案：C

78、输液速度可适当加快的病人是:

- A、 严重脱水者
- B、 心力衰竭者
- C、 输入升压药者
- D、 静脉补钾者

答案: A

79、输液引起急性肺水肿的典型症状是:

- A、 紫绀、胸闷
- B、 心悸、烦躁不安
- C、 胸痛、咳嗽
- D、 呼吸困难、咳粉红色泡沫痰

答案: D

80、心源性水肿最常见的病因是:

- A、 右心衰
- B、 左心衰
- C、 全心衰
- D、 原发性高血压

答案: A

81、患者,女性,60 岁,患慢性心力衰竭,服用地高辛,0.25 mg, qd,护士发药前应首先测量:

- A、 血压
- B、 心率及心律
- C、 呼吸
- D、 瞳孔

答案: B

82、患者,女性,30 岁,因“风湿性心脏病、二尖瓣狭窄”收入院。近日症状加重,医生要求护士观察心律变化。风湿性心脏病二尖瓣狭窄最常见的心律失常是:

- A、 心房颤动
- B、 房性期前收缩
- C、 室性期前收缩
- D、 房室传导阻滞

答案: A

83、下列哪项属于高血压三级:

- A、 $BP \geq 130 / 85 \text{ mmHg}$
- B、 $BP \geq 140 / 90 \text{ mmHg}$
- C、 $BP \geq 180 / 110 \text{ mmHg}$
- D、 $BP \geq 160 / 100 \text{ mmHg}$

答案: C

84、大咯血窒息处理首先:

- A、 加压吸氧
- B、 输血
- C、 注射止血药

D、清除口腔内血块

答案：D

85、某老年慢性支气管炎患者,因咳嗽、咳黄色脓痰入院,其起病、加重和复发的基本原因:

A、呼吸道感染

B、大气污染

C、吸烟

D、自主神经功能失调

答案：A

86、患者,男,46岁,咳嗽咳痰多年,近来呼吸困难加重伴双下肢水肿,心电图显示右室肥大,应考虑:

A、风心病

B、冠心病

C、慢性肺心病

D、慢性支气管炎

答案：C

87、患者,男性,56岁,支气管哮喘发作,呼吸困难。此时护士应协助患者采取的体位是:

A、半坐卧位

B、端坐位

C、中凹卧位

D、头高足低位

答案：B

88、肺结核诊断最可靠的依据是:

A、痰结核菌检查

B、结核菌素试验

C、肺部CT

D、红细胞沉降率

答案：A

89、患者,男性,36岁,上腹部无规律性疼痛1年,伴有食欲不振、恶心呕吐、餐后腹胀及反酸嗳气,查体左上腹轻压痛,此患者可能是:

A、急性胃炎

B、慢性胃炎

C、胃溃疡

D、十二指肠溃疡

答案：B

90、患者,男性,30岁,急性胰腺炎诊断明确。经过治疗,目前患者病情稳定。此时最主要的保健指导是:

A、避免暴饮暴食

B、注意饮食卫生

C、适当休息

D、教会患者减轻疼痛方法

答案：A

91、患者,男性,40 岁,因肝性脑病引起睡眠颠倒、意识错乱。对该患者护理中错误的是:

- A、 限制蛋白质饮食
- B、 生理盐水灌肠
- C、 弱酸性溶液灌肠
- D、 肥皂水灌肠

答案: D

92、对深昏迷脑出血病人,护理时尤其应注意防止:

- A、 压疮
- B、 呼吸道感染
- C、 泌尿系感染
- D、 口腔感染

答案: B

93、某女性,慢性肾炎病人,经住院治疗病情缓解,当其咨询保健知识时,护士的哪项保健指导不妥:

- A、 感染时选用青霉素类抗生素
- B、 注意个人卫生
- C、 长期禁盐
- D、 维持激素治疗

答案: C

94、处理癫痫大发作,首先应:

- A、 防止骨折
- B、 保持呼吸道通畅
- C、 遵医嘱快速给予脱水剂
- D、 松开衣领裤带

答案: B

95、患者女性,28 岁。因全身关节痛,面部有蝶形红斑,查血抗 Sm 抗体(+)。确诊为系统性红斑狼疮。医嘱避免日光照射,病室紫外线消毒时应回避,外出穿长袖上衣及长裤,戴帽或撑伞遮阳。原因是:

- A、 紫外线可致雌激素作用增强
- B、 紫外线是本病重要诱因
- C、 紫外线直接破坏细胞
- D、 紫外线加重关节滑膜炎

答案: B

96、女性,30 岁,半年前诊断为甲状腺功能亢进,妊娠 3 个月后,甲亢症状加重。治疗宜选:

- A、 卡比马唑
- B、 甲巯咪唑
- C、 甲基硫氧嘧啶
- D、 丙基硫氧嘧啶

答案: D

97、有糖尿病症状,空腹血糖值多少时可确诊为糖尿病:

- A、 $\geq 5.0 \text{ mmol/L}$
- B、 $\geq 6.0 \text{ mmol/L}$

- C、 ≥ 7.0 mmol/L
- D、 ≥ 10.0 mmol/L

答案: C

98、患者,女性,23岁,诊断为缺铁性贫血入院。护士为其进行饮食指导时,最恰当的食物组合是:

- A、 鱼、咖啡
- B、 瘦肉、牛奶
- C、 豆腐、绿茶
- D、 羊肝、橙汁

答案: D

99、为确诊疑似白血病病人,应进一步做下列哪项检查:

- A、 血小板计数
- B、 红细胞、血红蛋白检查
- C、 网织红细胞计数
- D、 骨髓检查

答案: D

100、慢性肾小球肾炎最主要的临床表现是:

- A、 水肿、少尿、高血压、蛋白尿
- B、 水肿、蛋白尿、血尿、高血压
- C、 水肿、少尿、蛋白尿、血尿
- D、 蛋白尿、氮质血症、高血压

答案: B

101、患者,女性,28岁,因畏寒,发热1天,腰痛伴尿路刺激征半日入院,诊断为急性肾盂肾炎,护士鼓励患者多饮水,其主要目的是:

- A、 加速退热
- B、 保持口腔清洁
- C、 维持体液平衡
- D、 促进细菌、毒素排出

答案: D

102、慢性肾功能衰竭治疗不当的是:

- A、 高蛋白饮食
- B、 给予富含必需氨基酸的优质蛋白
- C、 口服碳酸氢钠
- D、 限制水、钠摄入

答案: A

103、护理新生儿颅内出血,正确的是:

- A、 保持安静,避免声、光等刺激
- B、 不断吸痰以保持呼吸道通畅
- C、 给高浓度吸氧以纠正缺氧
- D、 将患儿置于稍凉的环境中

答案: A

104、关于急诊科的布局, 下列哪项不正确:

- A、 尽量远离住院部
- B、 有专门的出入口通道
- C、 分诊室设立在入口明显位置
- D、 清创室与抢救室、外科诊室相邻

答案: A

105、以下哪项不属于分诊护士的职责范围:

- A、 分清病人的轻重缓急
- B、 对所有急诊病人进行登记
- C、 维持就诊环境
- D、 参与急救

答案: D

106、哪项不是胃肠内营养的常见并发症:

- A、 误吸
- B、 恶心、呕吐
- C、 胸胀、腹泻
- D、 厌食

答案: D

107、处理鼻出血的方法中哪项是错误的:

- A、 轻微出血可采用局部止血法
- B、 凡有较多量的出血均应立即行后鼻孔栓塞
- C、 一时找不到出血点可先行鼻腔填塞
- C、 有明显出血点已不出血者可用冷冻或烧灼止血

答案: B

108、肾移植病人的监护中哪一项是观察移植肾功能的显见指标:

- A、 体重
- B、 尿比重
- C、 血压
- D、 血 Cr、BUN

答案: B

109、预检护士掌握急诊就诊标准应做到:

- A、 一看、二问、三检查、四分诊
- B、 五定
- C、 四轻
- D、 三查七对、二人查对

答案: A

110、休克病人体位应采用:

- A、 仰卧位
- B、 膝胸位

- C、 中凹卧位
- D、 头高足低位

答案: C

111、全麻病人从手术室回来应为病人准备:

- A、 备用床
- B、 暂空床
- C、 暂空床加橡皮布和中单
- D、 麻醉床

答案: D

112、一次性口罩应:

- A、 每次更换
- B、 每小时更换
- C、 每 4 小时更换
- D、 每天更换

答案: C

113、破伤风杆菌感染的敷料最好的处理方法是:

- A、 燃烧
- B、 深埋
- C、 先消毒再清洗
- D、 煮沸

答案: A

114、男性,21 岁。大面积皮肤烧伤合并呼吸道烧伤,怀疑有铜绿假单胞菌感染。为该病人实施口腔护理时应选用的溶液是:

- A、 0.1 %醋酸溶液
- B、 复方硼酸溶液
- C、 0.2 %呋喃西林溶液
- D、 2 % - 3 %硼酸溶液

答案: A

115、为昏迷病人做口腔护理时不正确的是:

- A、 操作前将病人的义齿取下浸于冷开水中
- B、 从门齿处放入开口器
- C、 禁止漱口
- D、 护理前后清点棉球个数

答案: B

116、不宜用口腔测温的病人是:

- A、 精神异常
- B、 腹泻
- C、 坐浴后
- D、 直肠结核

答案: A

117、按发热程度划分,高热是指口腔温度在:

- A、 40 ℃
- B、 38 - 38.9 ℃
- C、 39 ℃
- D、 39.1 - 41 ℃

答案: D

118、多尿是指 24 小时尿量大于:

- A、 1000 ml
- B、 1500 ml
- C、 2000 ml
- D、 2500 ml

答案: D

119、下列哪项为诊断心动过速的脉搏次数:

- A、 >60 次/分
- B、 >80 次/分
- C、 >100 次/分
- D、 >120 次/分

答案: C

120、抢救青霉素过敏性休克病人时,首选的药物为:

- A、 盐酸异丙嗪
- B、 苯肾上腺素
- C、 盐酸肾上腺素
- D、 异丙肾上腺素

答案: C

121、输血的主要适应症是:

- A、 贫血
- B、 低蛋白血症
- C、 严重的感染
- D、 大出血

答案: D

122、输液中发生肺水肿时吸氧需用 20 % - 30 %的酒精湿化,其目的是:

- A、 使病人呼吸道湿润
- B、 使痰液稀薄,易咳出
- C、 消毒吸入的氧气
- D、 降低肺泡内泡沫表面张力

答案: D

123、成人胃管插入的长度为:

- A、 14 - 16 cm
- B、 20 - 30 cm

C、 45 - 55 cm

D、 60 - 70 cm

答案: C

124、关于鼻饲操作,下列叙述不正确的是:

A、 每次鼻饲量不超过 200 ml

B、 检查胃管是否通畅

C、 鼻饲前应证实胃管是否在胃内

D、 果汁与牛奶可以同时鼻饲

答案: D

125、给鼻饲病人进食后,再注入少量温开水的目的是:

A、 使病人胃内温暖,避免胀气

B、 防止鼻饲液返流

C、 防止病人恶心呕吐

D、 冲洗胃管,避免堵塞

答案: D

126、病人许某,需作隐血试验,试验期内不可摄入的食物是:

A、 白菜

B、 土豆

C、 豆制品

D、 绿色蔬菜

答案: D

127、关于粪便的颜色与其临床意义的叙述错误的是:

A、 柏油样便--上消化道出血

B、 果酱样便--肠套叠

C、 陶土色便--幽门梗阻

D、 鲜红色便--痔疮、直肠息肉

答案: C

128、青霉素药物现配现用的主要目的是:

A、 防止差错事故的发生

B、 防止出现药物配伍禁忌

C、 防止引起过敏,效价降低

D、 减少中毒性反应

答案: C

129、禁忌做青霉素过敏试验的病人是:

A、 首次用青霉素

B、 停药三天

C、 使用中更换批号

D、 已知病人有青霉素过敏史者

答案: D

130、输液时发生静脉炎,错误的护理措施是:

- A、患肢制动
- B、患肢可用 50 %硫酸镁湿敷
- C、超短波理疗
- D、患肢下垂

答案: D

131、患者,女性,50 岁,因胸闷、咳嗽、咳痰、呼吸困难,尿少就诊,既往有风湿性心脏病二尖瓣狭窄。考虑患者出现了心力衰竭,诱发心力衰竭最常见的因素是:

- A、呼吸道感染
- B、体力活动过多
- C、精神压力过大
- D、高盐饮食

答案: A

132、某风心病二尖瓣狭窄患者,因发生急性肺水肿而急诊,给予酒精湿化给氧,静脉注射吗啡 5 mg,速尿 20 mg 等治疗。给酒精湿化吸氧的目的:

- A、减少呼吸道分泌物
- B、改善肺循环,减轻肺水肿
- C、扩张支气管,改善通气
- D、降低肺泡内泡沫的表面张力

答案: D

133、心室纤颤最常见的病因是:

- A、休克
- B、急性心肌梗死
- C、心肌病
- D、心脏瓣膜病

答案: B

134、心肌梗死特征性心电图改变为:

- A、T 波倒置,ST 段抬高,深而宽的异常 Q 波
- B、P 波>0.25 mV
- C、电轴<-30°
- D、Q-T 间期>0.40 秒

答案: A

135、二尖瓣狭窄的面容特征是:

- A、两颊部蝶形红斑
- B、两颊部绯红,口唇轻度发绀
- C、两颊黄褐斑
- D、午后两颊绯红

答案: B

136、缩唇呼吸的重要性是:

- A、锻炼呼吸肌

- B、减轻呼吸闲难
- C、避免小气道塌陷
- D、减少胸痛

答案: C

137、患者,男性,65 岁,既往有慢性肺心病病史 10 年,肺心病发生的关键环节是:

- A、肺动脉高压
- B、右心室扩大
- C、左心室肥大
- D、体循环淤血

答案: A

138、慢性肺心病长期家庭氧疗,每日持续吸氧时间应超过:

- A、 7h
- B、 9h
- C、 19h
- D、 15h

答案: D

139、患者剧烈咳嗽后咯血 200ml,表情恐怖、张口瞪目、双手乱抓。此时,置患者于头低足高位,进而护士应采取的首要护理措施是:

- A、 加压吸氧
- B、 指导患者有效咳嗽
- C、 立即清除呼吸道内血块
- D、 注射止血剂

答案: C

140、患者男性,53 岁。慢性咳嗽、咳痰病史 20 余年,近 3 日来咳嗽咳痰加重,伴呼吸困难、发绀、发热、表情淡漠、嗜睡。血气分析 PaO₂ 45mmHg, PaCO₂ 70mmHg。最确切的诊断是:

- A、心力衰竭
- B、呼吸衰竭
- C、肺性脑病
- D、代谢性酸中毒

答案: C

141、十二指肠溃疡的疼痛规律是:

- A、上腹隐痛
- B、进餐-疼痛-缓解
- C、疼痛-进餐-缓解
- D、餐后 30 - 60 分钟内出现

答案: C

142、患者,女性,47 岁。慢性乙肝 5 年,乏力、纳差 2 月,腹胀、少尿半个月。查体:生命体征无明显异常。消瘦,神志清楚,肝病面容,巩膜轻度黄染,肝掌,右侧面颈部可见蜘蛛痣,蛙状腹。该患者最常见的并发症是:

- A、上消化道出血
- B、肝性脑病

- C、 感染
- D、 肝肾综合征

答案: A

143、患者, 男性, 56 岁, 肝硬化病史 2 年, 因上消化道大量出血急诊入院, 后并发肝性脑病, 出血后 3 天未排大便, 应首选的措施是:

- A、 清水灌肠
- B、 开塞露
- C、 肥皂水灌肠
- D、 25 %硫酸镁导泻+乳果糖口服

答案: D

144、患者男性, 55 岁。1 年内出现 3 次突然说话不流利, 每次持续 30 分钟左右, 第 3 次发作时伴有右侧肢体麻木, 神经系统检查正常, 动脉硬化病史 2 年, 最可能的诊断是

- A、 癫痫部分性发作
- B、 偏头痛
- C、 颈椎病
- D、 短暂性脑缺血发作

答案: D

145、患者女性, 60 岁。突然出现剧烈头痛, 伴有喷射状呕吐, 很快出现意识模糊, 且脑膜刺激征阳性, 此患者可能的诊断是:

- A、 脑出血
- B、 脑栓塞
- C、 蛛网膜下腔出血
- D、 脑血栓形成

答案: C

146、下列关于脑血管疾病患者的护理措施, 错误的是:

- A、 脑出血发病 24 - 48 小时内避免搬动
- B、 脑出血患者应取侧卧位, 头部稍抬高 15 - 30 °
- C、 脑血栓患者应取平卧位
- D、 脑血栓患者头部使用冰袋及冷敷

答案: D

147、系统性红斑狼疮最具特征性的皮损是:

- A、 蝶形红斑
- B、 紫癜
- C、 玫瑰疹
- D、 血肿

答案: A

148、类风湿关节炎最常见特异性皮肤表现是:

- A、 类风湿结节
- B、 巩膜炎
- C、 胸腔积液
- D、 心包炎

答案: B

149、对轻症甲状腺功能亢进症病人的保健指导是:

- A、 卧床休息
- B、 参加轻工作
- C、 高热量和低钾饮食
- D、 高纤维素饮食

答案: B

150、某 2 型糖尿病患者, 50 岁, 实际体重超过标准体重的 25 %其饮食总热量应:

- A、 按实际体重计算再酌减
- B、 按实际体重计算再酌增
- C、 按标准体重计算再酌减
- D、 按标准体重计算再酌增

答案: C

151、患者男性, 50 岁。患急性再障, 住院期间突然出现剧烈头痛、呕吐、双侧瞳孔大小不等、一侧肢体瘫痪, 血小板低于 $20 \times 10^9/L$, 首先应考虑为:

- A、 颅内感染
- B、 颅内出血
- C、 脑膜炎
- D、 出血性休克

答案: B

152、慢性粒细胞白血病患者慢性期最突出的体征是:

- A、 乏力
- B、 消瘦
- C、 低热
- D、 脾大

答案: D

153、某病人既往曾有肾小球肾炎史, 因病情稳定上班工作。近日, 在单位体检时发现血压升高, 来医院复查, 证实为慢性肾小球肾炎急性发作。为迅速而有效地缓解症状, 应考虑下列哪项措施为最佳:

- A、 卧床休息
- B、 低盐饮食
- C、 利尿降压
- D、 激素疗法

答案: C

154、原发性肾病综合征病人的临床表现不包括:

- A、 水肿
- B、 高脂血症
- C、 蛋白尿
- D、 高血压

答案: D

155、emergency medicine 是：

- A、 院前急救
- B、 重症监护
- C、 急诊科
- D、 急诊医学

答案：D

156、下列哪一项不属急诊护理观察技巧：

- A、 问
- B、 听
- C、 触
- D、 教

答案：D

157、急诊科观察室床位数占医院总床数的：

- A、 4 %
- B、 5 %
- C、 6 %
- D、 7 %

答案：B

158、排列出院病历, 体温单的上面是：

- A、 检验报告单
- B、 医嘱单
- C、 病史及体格检查单
- D、 护理记录单

答案：B

159、为预防急性肾衰竭, 哪种外伤病人, 应从静脉输入碱性溶液以碱化尿液：

- A、 大腿挤压伤
- B、 肾挫伤
- C、 前壁裂伤
- D、 肋骨骨折

答案：A

160、下列哪种心律失常采用非同步电复律：

- A、 阵发性室上性心动过速
- B、 房颤
- C、 心室颤动
- D、 房扑

答案：C

161、建立家庭访视制度的时期是：

- A、 胎儿期
- B、 新生儿期

- C、 婴儿期
- D、 学龄期

答案: B

162、百白破疫苗初种的年龄是:

- A、 生后 2--3 天至 2 个月
- B、 生后 2--4 个月
- C、 生后 3--5 个月
- D、 生后 4--8 个月

答案: C

163、金黄色葡萄球菌肺炎患儿突然出现呼吸急促, 首先应考虑:

- A、 高热
- B、 酸中毒
- C、 肺炎加重
- D、 脓气胸

答案: D

164、肺炎链球菌肺炎患儿首选的抗菌素是:

- A、 青霉素-G
- B、 链霉素
- C、 氯霉素
- D、 庆大霉素

答案: A

165、支原体肺炎时, 50%-70%患儿呈阳性的检查是:

- A、 血清冷凝集试验
- B、 血培养
- C、 血常规
- D、 C 反应蛋白

答案: A

166、判断脱水类型最有效的辅助检查是:

- A、 测量体重
- B、 计算尿量
- C、 血钠浓度
- D、 血钾浓度

答案: C

167、不属于婴幼儿腹泻导致代谢性酸中毒的原因是:

- A、 腹泻丢失大量碱性物质
- B、 腹泻致饥饿性酮症
- C、 组织灌流不足, 乳酸堆积
- D、 频繁呕吐, 丢失大量胃液

答案: D

168、婴幼儿腹泻护理措施中错误的一项是：

- A、 做好床边隔离
- B、 加强臀红护理
- C、 调整饮食
- D、 早期使用止泻剂

答案：D

169、患儿 8 个月，佝偻病。中度等渗性脱水入院。经输液治疗后脱水已纠正，出现面肌抽动。首先考虑：

- A、 低血糖症
- B、 低钙血症
- C、 低钾血症
- D、 低镁血症

答案：B

170、维生素 D 缺乏性佝偻病患儿实验室检查的表现为：

- A、 血清蛋白降低
- B、 血糖降低
- C、 血胆固醇降低
- D、 血钙磷乘积降低

答案：D

171、不属于小儿出生时存在，以后逐渐消失的神经反射：

- A、 吸吮反射
- B、 觅食反射
- C、 拥抱反射
- D、 吞咽反射

答案：D

172、小儿化脓性脑膜炎最常见的感染途径是：

- A、 血行感染
- B、 上行感染
- C、 淋巴感染
- D、 医源性感染

答案：A

173、不属于小儿高热惊厥的临床特点是：

- A、 年龄多在 6 个月至 3 岁
- B、 多发生在病初突发高热时
- C、 预后较差可演变为癫痫
- D、 神智恢复快，无神经征

答案：C

174、患儿，10 个月，因高热惊厥入院。经治疗痊愈，准备出院，对其家长健康指导的重点是：

- A、 合理喂养的方法
- B、 体格锻炼的方法

- C、 惊厥预防及急救措施
- D、 预防接种的时间

答案: C

175、营养性巨幼细胞性贫血所缺乏的营养物质是:

- A、 缺乏热能、蛋白质
- B、 缺乏维生素 A
- C、 缺乏铁
- D、 缺乏维生素 B12、叶酸

答案: D

176、患儿 6 个月,患鹅口疮 5 天。其首选的护理诊断/问题是:

- A、 疼痛:与口腔黏膜炎症有关
- B、 营养失调:与拒食有关
- C、 体温过高:与感染有关
- D、 口腔黏膜改变:与感染有关

答案: D

177、小儿尿路感染最常见的病原体为:

- A、 大肠埃希菌
- B、 克雷伯杆菌
- C、 变形杆菌
- D、 金黄色葡萄球菌

答案: A

178、营养缺乏性贫血时肝脾肿大的原因是:

- A、 心力衰竭
- B、 铁剂缺乏
- C、 蛋白质缺乏
- D、 骨髓外造血

答案: D

179、用铁剂治疗贫血时,可同时服用:

- A、 牛乳
- B、 茶水
- C、 咖啡
- D、 维生素 C

答案: D

180、小儿急性上呼吸道感染时,确诊为链球菌感染者应使用:

- A、 利巴韦林
- B、 阿昔洛韦
- C、 青霉素
- D、 庆大霉素

答案: C

181、下列关于头围的说法正确的是：

- A、 出生时平均 32 cm
- B、 3 个月时 34 cm
- C、 1 岁时 46 cm
- D、 2 岁时 50 cm

答案：C

182、发育先慢后快的是：

- A、 神经系统
- B、 生殖系统
- C、 淋巴系统
- D、 皮下脂肪

答案：B

183、手足抽搐症的主要死亡原因是：

- A、 全身惊厥
- B、 手足搐搦
- C、 喉痉挛
- D、 低血钙

答案：C

184、不属于左向右分流型先天性心脏病的共同特点的是：

- A、 潜在性紫绀
- B、 肺循环血量增多
- C、 体循环血量减少
- D、 胸骨右缘闻及舒张期杂音

答案：D

185、新生儿期：

- A、 妊娠 28 周至生后 1 周
- B、 从受精至分娩
- C、 出生至 28 天
- D、 出生至 12 个月

答案：C

186、儿科就诊的年龄范围是：

- A、 0 - 12 周岁
- B、 0 - 13 周岁
- C、 0 - 14 周岁
- D、 0 - 15 周岁

答案：C

187、下列关于人工喂养的护理措施中不正确的是：

- A、 配制乳汁时,注意浓度和量
- B、 乳汁温度与体温相近

- C、喂奶时,奶头里应充满乳汁
- D、奶头孔的大小以奶瓶倒置时呈直线流出为宜

答案: D

188、婴儿为了补充铁剂,最早需要添加的辅助食品是:

- A、新鲜水果
- B、蔬菜
- C、粥
- D、蛋黄

答案: D

189、母乳与牛奶相比其优点是:

- A、蛋白质多
- B、乳糖少
- C、矿物质多
- D、脂肪酶多

答案: D

190、下列辅食添加的原则中错误的一项是:

- A、循序渐进
- B、由少到多
- C、由稀到稠
- D、由粗到细

答案: D

191、新生儿寒冷损伤综合征的常见的表现不包括:

- A、反应低下
- B、皮肤硬凉
- C、体温不升
- D、硬肿部位中间软四周硬

答案: D

192、新生儿黄疸在生后 24 小时内出现应首先考虑:

- A、新生儿肝炎
- B、生理性黄疸
- C、新生儿败血症
- D、新生儿溶血症

答案: D

193、新生儿颅内出血的常见病因不包括:

- A、缺氧因素
- B、产伤因素
- C、血清胆红素浓度过高
- D、高渗液体输入过快

答案: C

194、患儿 8 天,足月顺产,2 天来皮肤黄染,反应差,不吃奶。查体:体温不升,面色发灰,脐部少量脓性分泌物。最可能的诊断是:

- A、 新生儿溶血症
- B、 新生儿败血症
- C、 新生儿肝炎
- D、 新生儿硬肿症

答案: B

195、患儿,出生时皮肤苍白,心率 40 次/分,无呼吸,四肢略屈曲,弹足底无反应。患儿 Apgar 评分为:

- A、 0 分
- B、 1 分
- C、 2 分
- D、 3 分

答案: C

196、新生儿 Apgar 评分体征中,以下那项是无关的:

- A、 皮肤颜色
- B、 心率和呼吸次数
- C、 弹足底反应
- D、 出生体重

答案: D

197、关于早产儿的特点,正确的是:

- A、 皮肤毳毛多
- B、 足底纹理多
- C、 乳腺有结节
- D、 头发分条清楚

答案: A

198、足月儿是指:

- A、 胎龄>28 周至 40 周的新生儿
- B、 胎龄>28 周至<37 周的新生儿
- C、 胎龄 $\geq$ 37 周至<42 周的新生儿
- D、 胎龄为第 37 周的新生儿

答案: C

199、以下 4 : 3 : 2 液的张力是:

- A、 1 / 3 张
- B、 1 / 2 张
- C、 2 / 3 张
- D、 等张

答案: C

200、符合 I 度营养不良的诊断标准的是:

- A、 体重低于正常均值的 15 % - 25 %
- B、 精神萎靡

- C、 肌肉明显松弛
- D、 腹部皮下脂肪 0.4 cm 以下

答案: A

201、中骨盆平面横径长度平均是:

- A、 9 cm
- B、 10 cm
- C、 11.5 cm
- D、 11 cm

答案: B

202、生殖器官发育最显著的时期是:

- A、 新生儿期
- B、 幼年期
- C、 青春期
- D、 性成熟期

答案: C

203、月经周期调节的主要环节是:

- A、 神经中枢调节
- B、 下丘脑-腺垂体-卵巢的相互协调
- C、 卵巢产生的雌、孕激素调节
- D、 腺垂体前叶对卵巢的调节

答案: B

204、先兆流产与难免流产的主要鉴别点是:

- A、 早孕反应是否存在
- B、 腹痛的程度
- C、 妊娠免疫试验
- D、 宫颈口是否已经开大

答案: D

205、关于子宫的描述,下列错误的是:

- A、 成人子宫重约 50g
- B、 成年妇女子宫体与子宫颈之比为 2:1
- C、 子宫体壁由内膜层、肌层、浆膜层组成
- D、 宫颈内口为子宫颈癌的好发部位

答案: D

206、出口后矢状径是指:

- A、 耻骨联合上缘中点至骶岬上缘中点间的距离
- B、 耻骨联合下缘至骶岬上缘中点间的距离
- C、 两侧坐骨棘间的距离
- D、 骶尾关节至坐骨结节间径中点间的距离

答案: D

207、女性 25 岁,月经规律,周期 29 天,上月月经是 7 月 25 日,护士为其计算排卵日期约在 8 月:

- A、 1 日
- B、 4 日
- C、 9 日
- D、 12 日

答案: C

208、妊娠期母体变化哪项不对:

- A、 妊娠 32~34 周血容量增加达高峰
- B、 妊娠晚期易发生外阴及下肢静脉曲张
- C、 子宫峡部在妊娠后期形成子宫下段
- D、 妊娠末期孕妇血液处于低凝状态

答案: D

209、妊娠末期,孕妇若较长时间取仰卧姿势,则易发生:

- A、 妊娠期高血压疾病
- B、 前置胎盘
- C、 胎膜早破
- D、 仰卧位低血压综合征

答案: D

210、B 超检查可见胎心搏动的孕周为

- A、 8 周末起
- B、 12 周末起
- C、 16 周末起
- D、 20 周末起

答案: A

211、以下属于枕右前位的描述是:

- A、 胎头在耻骨上方,胎心位于脐左下方
- B、 胎头位于宫底处,胎心位于脐右上方
- C、 胎头在下方,胎心位于脐右下方
- D、 胎头在脐左侧,胎心靠近脐下方

答案: C

212、27 岁妇女,平时月经周期规律,现停经 48 天,近几天晨起恶心、厌油,有尿频症状,诊断为:

- A、 病毒性肝炎
- B、 肾盂肾炎
- C、 早期妊娠
- D、 妊娠剧吐

答案: C

213、孕妇,27 岁。末次月经 2020 年 8 月 18 日,该孕妇的预产期是:

- A、 2021 年 3 月 17 日
- B、 2021 年 4 月 23 日

C、 2021 年 5 月 18 日

D、 2021 年 5 月 25 日

答案: D

214、孕妇, 24 岁, 妊娠 20 周来院进行产前检查, 目前产妇进行产前检查的频率应当是:

A、 每 1 周一次

B、 每 2 周一次

C、 每 3 周一次

D、 每 4 周一次

答案: D

215、在正常分娩中, 哪项动作可以使胎头矢状缝转变为与中骨盆及骨盆出口前后径一致:

A、 外旋转

B、 内旋转

C、 仰伸

D、 俯屈

答案: B

216、宫缩的特点, 下列不正确的是:

A、 随意性

B、 节律性

C、 对称性

D、 极性

答案: A

217、患者女, 36 岁孕妇。产前检查漏斗骨盆。现足月妊娠, 胎膜早破来诊。查体: 胎头入盆。医嘱: 入院行各项检查, 拟次日行剖宫产术。护士对其进行健康教育, 不正确的内容是:

A、 讲明产道异常对母儿的影响

B、 鼓励术前适当下床活动

C、 解释剖宫产术前、术后注意事项

D、 嘱其保持会阴清洁

答案: B

218、不属于产褥期生理变化的是:

A、 分娩后 2~3 d 乳汁开始分泌

B、 产后 24h 内体温 38.5℃

C、 产后脉搏 60~70 次/分

D、 子宫体 6~8 周恢复到正常大小

答案: B

219、孕卵着床的时间约为受精后第:

A、 2-3 日

B、 3-4 日

C、 5-6 日

D、 6-7 日

答案: D

220、关于母乳喂养的益处, 正确的是:

- A、 可预防产妇产后出血
- B、 母乳喂养期可完全达到避孕的效果
- C、 可增强新生儿肢体的活动力
- D、 可减轻产妇的体重

答案: A

221、每次哺乳前, 产妇清洁乳房应:

- A、 用湿毛巾擦净乳房
- B、 用肥皂水清洗乳房
- C、 用酒精消毒乳房
- D、 用专用消毒剂消毒乳房

答案: A

222、下列不属于早产临产诊断的依据是:

- A、 妊娠满 28 周至不满 37 足周
- B、 子宫规律收缩 (20 分钟 $\geq$ 4 次) 且每次持续 $\geq$ 30s
- C、 宫颈管缩短 $\geq$ 75%
- D、 阴道分泌物增多

答案: D

223、下列关于子痫患者的护理措施不正确的是:

- A、 减少刺激
- B、 严密监护
- C、 病室明亮
- D、 专人护理, 防止受伤

答案: C

224、某孕妇, 27 岁, 孕 34 周。因“头晕、头痛”就诊。查体: 血压 160 / 115 mmHg, 实验室检查, 水肿 (+), 尿蛋白定量 5.5g / 24 h, 临床诊断为重度子痫前期。首选解痉药物是:

- A、 糖皮质激素
- B、 硫酸镁
- C、 阿托品
- D、 冬眠合剂

答案: B

225、下列针对妊娠期妇女便秘的护理措施, 不恰当的是:

- A、 养成定时排便的习惯
- B、 每天多饮水
- C、 适当运动
- D、 自行服用缓泻药

答案: D

226、前置胎盘病人的辅助检查中不主张应用的是:

- A、 产科检查
- B、 超声波检查

- C、 阴道检查
- D、 腹部检查

答案: C

227、一产妇,孕 3 产 1,因怀疑前置胎盘行剖宫产,胎儿娩出后行人工剥离胎盘很困难,发现胎盘部分绒毛植入子宫肌层,出血不止。下面哪项处理是恰当的:

- A、 子宫全切
- B、 刮宫术
- C、 按摩子宫
- D、 立即给予缩宫素

答案: A

228、初产妇,妊娠 38 周,合并心脏病已临产。心率 100 次/分,心功能Ⅲ级。骨盆测量正常。宫口开大 5 cm,枕左前位,先露 S+1。下列分娩方式哪项最适宜:

- A、 严密观察产程,等待自然分娩
- B、 待宫口开全后行阴道助产
- C、 适当加腹压缩短第二产程
- D、 应行剖宫产结束分娩

答案: D

229、子宫收缩乏力的止血措施首选:

- A、 宫腔填塞纱布条
- B、 按摩子宫并注射缩宫素
- C、 压迫腹主动脉
- D、 结扎子宫动脉

答案: B

230、关于羊水栓塞的描述,正确的是

- A、 羊水栓塞多发生于子宫收缩乏力的产妇
- B、 人工破膜时应在子宫收缩间歇期
- C、 宫缩过强者,不应给予减弱子宫收缩药物以免影响产程进展
- D、 中期妊娠羊膜腔穿刺引产术不会发生羊水栓塞

答案: B

231、下列哪项不是先兆子宫破裂的诊断依据:

- A、 先露部下降受阻,产程延长
- B、 血尿
- C、 病理缩复环
- D、 血红蛋白下降

答案: D

232、陈女士,因子宫破裂,胎儿死亡,行子宫切除术。术后制定心理调适护理措施,哪项不妥:

- A、 允许产妇诉说内心感受
- B、 适当时候向产妇解释胎儿死亡原因
- C、 安排与哺乳产妇同住一室
- D、 鼓励家属多陪伴产妇

答案: C

233、下列育龄期妇女,适用于口服避孕药避孕的是:

- A、 子宫畸形者
- B、 患者慢性肝炎
- C、 哺乳期妇女
- D、 月经稀少者

答案: A

234、某妇女,30 岁。产后 4 个月,未来月经,医院询问避孕方法。体检:宫颈光滑,子宫正常大小,无压痛,双侧附件阴性,不宜选用的避孕方法是:

- A、 宫内节育器
- B、 口服避孕药
- C、 避孕套
- D、 安全期避孕

答案: B

235、患者女性,58 岁,医生诊断为外阴炎,护士指导患者正确的是:

- A、 搔抓
- B、 热水烫
- C、 坐浴
- D、 输液治疗

答案: C

236、患者女性,35 岁,已生育,医生诊断为宫颈重度糜烂,宫颈 TCT 检查正常,需局部物理治疗。患者询问禁止性生活和盆浴的时间,护士应回答:

- A、 2 周
- B、 4 周
- C、 6 周
- D、 8 周

答案: D

237、患者女性,38 岁,体检时发现子宫脱出,膀胱及直肠膨出。诊断为子宫脱垂,患者非常紧张询问护士,护士告知与发生子宫脱垂无关的是:

- A、 多产
- B、 手取胎盘
- C、 产后过早参加体力劳动
- D、 习惯性便秘

答案: B

238、绒毛膜癌病人的主要治疗原则为:

- A、 进行放疗
- B、 同位素治疗
- C、 子宫切除
- D、 以化疗为主

答案: D

239、葡萄胎清宫时应注意：

- A、 预防患者过度紧张
- B、 预防人工流产综合征
- C、 预防出血过多、穿孔、感染
- D、 讲解术后注意事项

答案：C

240、患者,女性,37 岁。因阴道分泌物增多及外阴瘙痒来就诊。诊断为滴虫性阴道炎,拟采用自主冲洗器灌洗阴道的方法,护士为其介绍使用方法时,告知其最适宜的冲洗液是：

- A、 1 %乳酸溶液
- B、 2 %呋喃西林
- C、 灭菌生理盐水
- D、 5.5 %醋酸溶液

答案：A

241. 选择静脉注射穿刺部位，下列哪项不妥

- A 选择粗直、弹性好的静脉
- B. 穿刺部位应避免关节
- C. 由近心端到远心端选择血管
- D. 避免在皮肤炎症处进针
- E. 不宜在静脉瓣部位进针

答案：C

242. 静脉注射操作中，下述不妥的是

- A. 长期注射者由远端到近端选择血管
- B. 在穿刺部位上方 2cm 处扎止血带
- C. 进针时，针头与皮肤呈 20° 角
- D. 在静脉. 上方或侧方进针
- E. 拔针后用干棉签按压穿刺点

答案：B

243. 用皮内注射法接种卡介苗，正确的步骤是 A. 注射前不需消毒注射部位皮肤

- B. 进针部位在前臂掌侧上段
- C. 进针时针头与皮肤呈 5° 角
- D. 注入药物前要抽回血
- E. 拔针后用干棉签轻压针刺处

答案：C

244. 下列药物中，不需做过敏试验的是

- A. 普鲁卡因
- B. 链霉素

C. 破伤风抗毒素

D. 左氧氟沙星

细胞色素 C

答案: D

245. 关于皮试过程的叙述, 不正确的是

A. 皮试前应评估病人的用药史、药物过敏史. B. 查对姓名、床号、皮试的药物

C. 常用部位为前臂掌侧下 1/3 处

D. 无自觉反应即可判断皮试阳性

E. 皮丘隆起变大, 直径超过 1cm 是皮试阳性的表现

答案: D

246. 下列皮试液 1ml 内含量错误的是

A. 青霉素: 500U

B. 链霉素: 2500U

C. 破伤风抗毒素: 150IU

D. 细胞色素 C: 7.5mg

E. 普鲁卡因: 2.5mg

答案: D

247. 对破伤风抗毒素过敏试验阳性病员的处理是

不能注射

B. 将破伤风抗毒素分四等分, 分次注射

将破伤风抗毒素剂量逐渐递增, 分次注射

D. 将破伤风抗毒素剂量逐渐递减, 分次注射

E. 将破伤风抗毒素分五等分, 分次注射

答案: C

248. 配制青霉素快速过敏试验液, 稀释溶液用

A. 生理盐水

B. 注射用水

C. 5%葡萄糖盐水

D. 5%葡萄糖溶液

E. 0.25%普鲁卡因

答案: A

249. 对于青霉素皮试结果阳性者, 以下哪种做法不妥 A. 禁用青霉素

B. 告知病人及家属今后禁用青霉素

C. 将试验结果在注射卡上做醒目标识

D. 将试验结果填在体温单上

E. 用生理盐水在对侧相应部位做对照试验

答案: E

250. 在青霉素批号没有改变的情况下, 使用时免做过敏试验的间隔时间不超过

A. 14 天

B. 7 天

C. 5 天

D. 3 天

E. 1 天

答案: D

251. 当病人发生青霉素过敏性休克时, 在皮下注射 0.1% 盐酸肾上腺素 1ml 的同时立即

A. 报告医生

B. 置病人平卧位

C. 氧气吸入

D. 建立静脉通道

E. 注射抗组胺类药

答案: B

251. 不符合破伤风抗毒素皮试结果阳性的表现 A. 局部皮丘红肿扩大

B. 硬结直径为 1cm

C. 红晕大于 4cm

D. 皮丘周围有伪足、痒感

E. 病人出现气促、发绀、荨麻疹

答案: B

252. 女性, 50 岁。患急性扁桃体炎来门诊治疗。医嘱给复方新诺明口服, 每天 2 次。护士为其进行的用药指导, 哪项不正确

A. 向病人解释药物的作用、特点

B. 服药时间为上午 6 时和下午 6 时

C. 服药期间应多饮水

D. 服药期间应多食蔬菜和水果、

E. 有不适的感觉应及时来医院就诊

答案: B

253. 男性, 36 岁。在输液时因液体输入过快发生了肺水肿, 下列护理措施中不正确的是

- A. 立即通知医生，积极配合抢救
- B. 立即停止输液
- C. 采用端坐位，两腿下垂，减少回心血量
- D. 低流量吸氧，同时给 20% ~ 30%乙醇进行湿化
- E. 选用镇静剂、血管扩张剂和强心剂

答案: D

254. 某病人，输液过程中发生溶液不滴，挤压输液管有阻力，松手后无回血，处理应

- A. 另选血管重新穿刺
- B. 调整针头位置
- C. 更换针头重行穿刺
- D. 抬高输液瓶位置
- E. 局部热毛巾热敷

答案: C

255. 男性，55 岁。因脑出血急诊入院，根据医嘱给予甘露醇 250ml 静脉输液，要求 30 分钟滴完，输液滴速应调为

- A. 110 滴/分
- B. 115 滴 1 分
- C. 120 滴 1 分
- D. 125 滴 1 分
- E. 130 滴/分

答案: D

256. 某病人，输大量库血后心率缓慢，手足搐搦，血压下降，伤口渗血，其原因是

- A. 血钾升高
- B. 血钾降低
- C. 血钙升高
- D. 血钙降低
- E. 血钠降低

答案: D

257. 男性，55 岁。因肝硬化，食管曲张静脉破裂大出血急诊入院。遵医嘱输血，输血过程中，病人出现手足搐搦、血压下降、出血倾向，病人出现了 A. 休克:

- B. 发热反应
- C. 过敏反应
- D. 溶血反应
- E. 枸橼酸钠中毒反应

答案: E

(258~260 题共用题干)

258. 女性, 70 岁。因支气管哮喘急性发作入院治. 疗, 经静脉输入药物 2 天后病情缓解。今天输液 1 小时后, 病人突然面色苍白、呼吸困难、气促、咳嗽加重、咳血性泡沫样痰。

1. 考虑病人是

- A. 哮喘再次发作
- B. 循环负荷过重
- C. 输液浓度过高
- D. 静脉空气栓塞
- E. 对药物过敏

答案: B

259. 应立即给病人安置的体位是

- A. 平卧位
- B. 左侧卧位
- C. 头高足低位
- D. 端坐位
- E. 休克卧位

答案: D

260. 处理措施中下述哪项不妥

- A. 停止输液
- B. 氧气吸入
- C. 给予缩血管药物
- D. 可使用镇静剂
- E. 必要时四肢轮扎

答案: C

(261~262 题共用题干)

女性, 23 岁。因再生障碍性贫血入院, 体检: 体温 38. 5℃, 面色苍白, 皮肤散在出血点。需长时间静脉输入抗胸腺细胞球蛋白治疗。

261. 为合理使用静脉, 选择血管时应

- A. 先上后下
- B. 先粗大后细小
- C. 先细直后弯曲
- D. 先近心端后远心端

E. 先远心端后近心端

答案: E

262. 病人静脉输液后沿静脉走行出现条索状红线, 并有肿痛, 护理措施不当的是

A. 局部理疗

B. 患肢抬高

C. 更换注射部位

D. 患肢活动增加

E. 50%硫酸镁热湿敷

答案: D

(263~264 题共用题干)

男性, 45 岁。患十二指肠溃疡, 突然呕血, 面色苍白, 脉搏 120 次分, 血压 8/6kPa (60/45mmHg)。医嘱: 输血 400ml。

263. 给病人输血的目的是补充

A. 凝血因子

B. 血红蛋白

C. 血小板

D. 抗体

E. 血容量

答案: E

264. 为病人输两袋血之间应输入少量

A. 5%葡萄糖溶液

B. 5%葡萄糖氯化钠溶液

C. 0.9 %氯化钠溶液

D. 复方氯化钠溶液

E. 10%葡萄糖溶液

答案: C

265. 敌敌畏中毒洗胃时首选

A. 0.1%硫酸铜

B. 3%过氧化氢

C. 2%碳酸氢钠溶液

D. 1%盐水

E. 温开水

答案: C

266. 使用简易呼吸机时, 一般成人的挤压速度为

- A. 10~ 12 次/分
- B. 12~ 14 次/分
- C. 14~ 16 次/分
- D. 16~ 20 次/分
- E. 20 ~ 25 次/分

答案: D

267. 给儿童使用人工呼吸机, 潮气量的标准是每公斤

- A. 5ml
- B. 8ml
- C. 10ml
- D. 12ml
- E. 15ml

答案: C

268. 使用简易呼吸器挤压一次气囊送气量为

- A. 200 ~ 300ml
- B. 300 ~ 400ml
- C. 400 ~ 500ml
- D. 500 ~ 1000ml
- E. 1000 ~ 1500ml

答案: D

269. 病人使用人工呼吸机后, 如通气量过度可出现的症状是

- A 吸气时看到胸廓起伏
- B. 肺部呼吸音清晰
- C. 皮肤潮红、出汗
- D. 病人出现昏迷、抽搐
- E. 生命体征稳定

答案: D

270. 使用人工呼吸机注意事项中, 错误的一项是

- A. 定期做血气分析和电解质测定

- B. 做好口腔和皮肤护理
- C. 保持呼吸道通畅
- D. 病室空气每天消毒 1~2 次
- E. 呼吸器的湿化器应每周清洁、消毒

答案: E

271. 成人使用人工呼吸机, 潮气量的标准是每千克体重

- A. 5ml
- B. 6ml
- C. 8ml
- D. 17ml
- E. 12ml

答案: E

272. 临床死亡期的特征是

- A. 循环衰竭
- B. 呼吸衰竭.
- C. 各种反射消失
- D. 神志不清
- E. 肌张力丧失

答案: C

273. 病人出现深昏迷, 脑干反射消失, 脑电波消失, 无自主呼吸, 属于

- A. 疾病晚期
- B. 脑死亡期
- C. 濒死期
- D. 临床死亡期.
- E. 生物学死亡期

答案: B

274. 目前医学界对死亡判断依据是

- A. 呼吸停止
- B. 心跳停止
- C. 各种反射消失
- D. 脑死亡.

E. 瞳孔散大，对光反射消失

答案：D

275. 病人死亡后出现尸斑的时间大约在

A. 2~4 小时

B. 4~6 小时

C. 4~8 小时

D. 6~8 小时

E. 6~10 小时

答案：A

276. 濒死期病人临终阶段的心理反应，一般排列顺序为

否认期、忧郁期、协议期、愤怒期、接受期

B. 否认期、协议期、愤怒期、接受期、忧郁期

C. 否认期、愤怒期、协议期、忧郁期、接受期

D. 忧郁期、愤怒期、否认期、协议期、接受期

E. 忧郁期、否认期、愤怒期、协议期、接受期

答案：C

277. 下述哪项不属于临终护理的目的

A. 解除病人肉体痛苦

B. 缓解病人心理恐惧

C. 使病人舒适安静

D. 使病人五官端祥

E. 使家属获得安慰

答案：D

278. 临床上进行尸体护理的依据是

A. 心跳停止

B. 意识丧失

C. 各种反射消失

D. 瞳孔散大

E. 医生开具死亡诊断书后

答案：E

279. 进行尸体护理，下列做法不妥的是

A. 置尸体去枕平卧

B. 装上活动义齿

C. 必要时用绷带托扶下颌

D. 有伤口者要更换敷料

E. 各孔道用棉花填塞

答案: A

280. 一肺癌晚期病人, 男性, 46 岁。近来经常对妻子说:让我再多活一年就可以看到儿子大学毕业了。病人此时正处于心理反应哪一期

A. 否认期

B. 忧郁期

C. 协议期

D. 愤怒期

E. 接受期

答案: C

281. 女性, 70 岁。患晚期肝癌, 肝区剧烈疼痛, 腹水, 呼吸困难, 病人深感痛苦, 有自杀念头, 对病人的护理错误的是

A. 加强安全保护

B. 允许家属陪伴

C. 多给病人同情及照顾

D. 尽可能满足病人的需要

E. 尽量不让其流露出悲哀的情绪

答案: E

282. 某晚期癌症病人, 处于临终状态, 感到恐惧和绝望。当其发怒时, 护士应

A. 热情鼓励, 帮助病人树立信心.

B. 指导用药, 减轻病人痛苦

C. 说服教育, 使病人理智地面对病情

D. 理解忍让, 陪伴保护病人

E. 同情照顾, 满足病人的要求

答案: D

283. 需要提供低盐饮食的是.

A. 高热

B. 烧伤

C. 肝硬化腹水

D. 糖尿病

E. 甲状腺功能亢进

答案: C

284. 适用低蛋白饮食的病人是

- A. 肾病综合征病人
- B. 急性肾炎病人
- C. 高脂血症病人
- D. 甲状腺功能亢进病人
- E. 肝硬化腹水病人

答案: B

285. 病人不宜长期使用流质饮食的原因是

- A. 影响消化吸收
- B. 影响营养供给
- C. 影响食欲
- D. 影响休息
- E. 进食次数过多

答案: B

286. 腹泻病人应选择

- A. 少渣饮食
- B. 高脂肪饮食
- C. 高膳食纤维饮食
- D. 低盐饮食
- E. 低胆固醇饮食

答案: A

287. 低盐饮食要求每天限用食盐

- A. 2g
- B. 4g
- C. 6g
- D. 8g
- E. 10g

答案: A

288. 对病员饮食指导, 错误的是

- A. 急性肾炎应多吃蔬菜和含糖高的食物
- 高脂血症应禁食肥肉, 限制菜油、豆油
- 高血压应用低盐饮食
- D. 肝硬化腹水应增加肉、乳、豆类食物

E. 作甲状腺 ^{131}I 碘测定，检查前 2 周忌食海参

答案：D

289. 饮食护理下列哪项不妥

A. 护士应协助配餐员分发饮食

B. 进食前停止一切治疗和检查

C. 检查治疗饮食实施情况

D. 对危重病人喂食时速度适中

E. 危重病人进食后协助其漱口

答案：B

290. 大便隐血试验前，饮食中可选择.

A. 肉类

B. 肝类

C. 动物血

D. 豆制品、冬瓜

E. 绿色蔬菜

答案：D

291. 甲状腺 I^{131}I 功能测定，检查前应禁食

A. 淡水鱼

B. 白菜

C. 土豆

D. 紫菜

E. 鸡蛋

答案：D

292. 下列哪类病人不需要用管喂饮食

A. 手术后不能张口者

B. 拒绝进食者

C. 昏迷病人

D. 婴幼儿病情危重时

E. 高热病人需补充高热量流质时

答案：E

293. 测量鼻饲管插入长度的方法为

A. 耳垂到鼻尖的长度

B. 鼻尖到胸骨的长度

C. 鼻尖到剑突的长度

D. 前额发际到剑突的长度

E. 口唇到剑突的长度

答案: D

294. 插管操作结束后, 为证实胃管是否确在胃内, 进行检查时, 错误的方法是

A. 注入少量空气, 同时听胃部有无气过水声 B. 抽吸出胃液

C. 注入少量温开水, 同时听胃部有无气过水声 D. 胃管末端放入水杯有无气体溢出

E. 抽吸出液体用 pH 试纸测试

答案: C

295. 为病人进行鼻饲时, 每次鼻饲量不能超过 A. 100ml

B. 150ml

C. 200ml

D. 250ml

E. 300ml

答案: C

296. 给鼻饲病员更换胃管, 要求

A. 每天更换, 晚上拔管, 次晨插管

B. 每周更换, 晚上拔管, 次晨插管

C. 每周更换, 上午拔管, 晚上插管

D. 每天更换, 上午拔管, 晚上插管

E. 每天更换, 上午拔管, 次晨插管

答案: B

297. 鼻饲病人的护理, 下述不妥的是

A. 每次灌注前回抽胃液,

B. 每次鼻饲量 500ml

C. 每次灌注流质后应注入温开水

D. 每天进行口腔护理

E. 每周更换鼻饲管

答案: B

心脏骤停后最容易发生的继发性病理变化是

肺水肿

B. 急性肾衰竭

- C. 急性重型肝炎
- D. 脑缺氧和脑水肿
- E. 心肌缺氧性损伤

答案: D

299. 在意外事故现场, 对受难者诊断是否心跳停止, 最迅速有效的方法是

- A. 听心音
- B. 观察心尖搏动
- C. 测血压
- D. 作心电图
- E. 摸颈动脉搏动

答案: E

300. 心跳呼吸完全停止至脑细胞发生不可逆变化的时间为

- A. 1~2 分钟
- B. 2~4 分钟
- C. 4~6 分钟
- D. 6~8 分钟
- E. 8~ 10 分钟

答案: C

301. 循环骤停时, 对缺氧最敏感的是

- A. 大脑皮质
- B. 心肌
- C. 延髓呼吸中枢
- D. 皮质下中枢
- E. 血管运动中枢

答案: A

302. 一旦确诊为心搏骤停, 必须争取在几分钟钟内重建呼吸和循环

- A. 4~6 分钟
- B. 6~8 分钟
- C. 8~ 10 分钟
- D. 10~ 12 分钟
- E. 12~ 14 分钟

答案: A

303. 现场心肺复苏操作首要步骤是

- A. 建立静脉通路
- B. 胸外心脏按压
- C. 口对口人工呼吸
- D. 按额托项，保持呼吸道通畅
- E. 心内注射

答案：B

304. 实施人工呼吸前首要的护理措施是

- A. 将病人安置在空气新鲜的地方
 - B. 密切观察病人胸部的起伏状况
 - C. 清除口腔内的分泌物、呕吐物
 - D. 取下活动义齿，用开口器打开口腔
- 为病人取侧卧位并松开领口

答案：C

305. 两人操作时，胸外按压与吹气之比为

- A. 2: 1
- B. 3:1
- C. 4:1
- D. 30 : 2
- E. 6: 1

答案：B

306. 心脏复苏的首选药物是：

- A. 肾上腺素
- B. 阿托品
- C. 利多卡因
- D. 异丙肾. 上腺素
- E. 洛贝林

答案：A

307. 脑复苏的关键是

- A. 维持循环血量
- B. 维持血氧正常
- C. 防治脑水肿
- D. 纠正酸中毒

E. 防止肾衰竭

答案: C

308. 病人心肺复苏后, 脑复苏的主要措施是 A. 维持有效的循环

B. 确保呼吸道通畅

C. 降温和脱水疗法

D. 加强基础护理

E. 治疗原发疾病

答案: C

婴儿腹泻时最易发生的酸碱平衡紊乱是

混合性酸中毒

B. 代谢性酸中毒

C. 呼吸性酸中毒

D. 代谢性碱中毒

E 呼吸性碱中毒

答案: B

320. 属于等张液体的是

A. 5%碳酸氢钠溶液

B. 0.9 %氯化钠溶液

C. 1: 1 液

D. 10%葡萄糖溶液

E. 口服补液盐(ORS) 溶液

答案: B

311. 小儿迁延性腹泻的病程是

A. 1~4 周

B. 2~4 周

C. 1~8 周

D. 2~8 周

E. 3~12 周

答案: D

312. 需配制 1:1 液 200ml, 其配制方法为 5%葡萄糖液 100ml 中应加入生理盐水多少毫升

A. 50ml

B. 100ml

C. 150ml

D. 200ml

E. 250ml

答案: B

313. 等渗性脱水时, 血清钠浓度是

A. 100 ~120mmol/L

B. 110 ~ 130mmol/L

C. 120 ~ 140mmol/L

D. 130 ~ 150mmol/L

E. 150 ~ 170mmol/L

答案: D

314. 小儿腹泻导致中度脱水, 第 1 天的补液总量为 A. 60 ~ 90ml/kg

B. 90 ~ 120ml/kg

C. 120 ~ 150ml/kg

D. 150 ~ 180ml/kg

E. 180~ 210ml/kg

答案: C

315. 轮状病毒肠炎患儿的大便性状是

A. 黏液便

B. 果酱样便

C. 脓血便

D. 柏油便

E. 蛋花汤样便

答案: E

316. 静脉补钾的浓度一般不超过

A. 0.3‰ .

B. 0.3%

C. 3%

D. 2‰

E. 2 %

答案: B

317. 护理|腹泻患 I 儿时, 哪项措施不正确 A. 详细记录出入量

- B. 加强臀部护理
- C. 腹胀时应注意有无低钾血症
- D. 急性腹泻早期应使用止泻剂
- E. 呕吐频繁者应禁食、补液

答案: D

318. 小儿腹泻重症区别于轻症的要点是

- A. 蛋花汤样大便
- B. 大便腥臭有黏液
- C. 每日大便可达十余次
- D. 大便镜检有大量脂肪球
- E. 有水、电解质紊乱和酸中毒

答案: E

319. 不属于轮状病毒肠炎特点的是

- A. 多见于6个月~2岁小儿
- B. 多见于秋季
- C. 常伴有上呼吸道感染
- D. 全身中毒症状不明显
- E. 大便有腥臭味

答案: E

320. 小儿腹泻其脱水性质不明时, 第1天补液可选用 A. 1/4 张

- B. 1/3 张
- C. 1/2 张
- D. 2/3 张
- E. 等张

答案: C

321. 当补液纠正脱水和酸中毒时, 患儿突然发生惊厥, 可能是

- A. 低血钾
- B. 低血钠
- C. 低血钙
- D. 低血镁
- E. 低血糖

答案: C

322. 脱水患儿经补液后血容量已恢复的主要临床表现是

- A. 皮肤弹性恢复
- B. 血压恢复正常
- C. 眼眶凹陷恢复
- D. 口舌湿润，无口渴
- E. 尿量增加

答案: E

323. 男患儿, 3 个月。母乳喂养, 腹泻 2 个月, 大便 3~6 次 1 日, 稀或糊状, 无脓血。食欲好, 面部湿疹, 体重 5.6kg。考虑该患儿是

- A. 慢性腹泻
- B. 迁延性腹泻
- C. 生理性腹泻
- D. 饮食性腹泻
- E. 感染性腹泻

答案: C

324. 急性阑尾炎时, 最有诊断意义的体征是

- A. 腹肌紧张
- B. 腰大肌试验阳性
- C. 结肠充气试验阳性
- D. 闭孔肌试验阳性
- E. 阑尾点固定性压痛

答案: E

325. 急性阑尾炎非手术治疗期间, 体温升高, 全腹疼痛, 腹肌紧张, 其病情判断为.
并发腹腔脓肿

- B. 阑尾穿孔腹膜炎
- C. 阑尾坏疽
- D. 并发门静脉炎

E 形成阑尾周围脓肿

答案: B

326. 急性阑尾炎典型的症状为

- A. 右下腹痛
- B. 右下腹痛并伴有轻度胃肠功能紊乱

C. 腹膜刺激征

D. 右下腹固定性压痛性包块

E. 转移性右下腹痛

答案: E

327. 护理阑尾切除术后病人, 第 1 日应注意观察的并发症是

A. 内出血

B. 盆腔脓肿

C. 肠粘连

D. 门静脉炎

E. 切口感染

答案: A

328. 麦氏点位于

A. 左髂前上棘与脐连线中外 1/3 交界处

右髂前上棘与脐连线中外 1/3 交界处

左髂前上棘与脐连线中内 1/3 交界处

右髂前上棘与脐连线中内 1/3 交界处

E. 右髂前上棘与脐连线中外 2/3 交界处

答案: B

329. 阑尾手术切口的标志点为

A. 麦氏点

B. 华氏点

C. 墨氏点

D. 雷氏点

E. 左下腹

答案: A

330. 下列哪项不是急性阑尾炎术后给予半卧位的主要目的

A. 利于呼吸

B. 减轻切口张力

C. 预防肠粘连

D. 利于腹腔引流.

E. 腹腔渗液积聚于盆腔

答案: C

331. 提示阑尾炎的体格检查错误的是

- A. 结肠充气试验阳性
- B. 腰大肌试验阳性
- C. 麦氏点压痛
- D. 阑尾压痛
- E. 墨菲征阳性

答案: E

肝硬化腹水病人每日进水量限制在

- A. 1000ml
- B. 1500ml
- C. 2000ml
- D. 800ml
- E. 500ml

答案: A

333. 胆囊结石主要是

- A. 胆固醇结石
- B. 胆色素结石
- C. 混合性结石
- D. 泥沙样结石
- E. 胆固醇结石或胆固醇为主的混合性结石

答案: E

334. 胆总管结石好发部位是

- A. 上段
- B. 中上段
- C. 中段
- D. 中下段
- E. 下段

答案: D

335. 出现夏柯三联征的胆道疾病是

- A. 急性胆囊炎
- B. 胆囊结石

C. 胆总管结石合并胆管炎

D. 肝内胆管结石

E. 萎缩性胆囊炎

答案: C

336. 诊断胆石症的辅助检查方法, 首选

A. CT

B. 经皮肝穿刺胆道造影(PTC)

C. B 超

D. 经内镜逆行胰胆管造影(ERCP)

E. 静脉胆道造影

答案: C

337. 当前治疗胆囊结石的首选方法

A. 体外震波碎石

B. 溶石疗法

C. 中医治疗

D. 胆囊切除术

E. 胆囊切开取石

答案: D

338. 胆总管切取石术后腹腔引流液呈“胆汁”样, 应考虑

A. 正常引流液

B. 低蛋白血症

C. 胆瘘

D. 胰瘘

E. 肠瘘

答案: C

339. T 管造影后应开放引流多少小时以上

A. 4 小时

B. 8 小时

C. 10 小时

D. 12 小时

E. 24 小时

答案: E

340. 胆道手术后, T 管一般留置的时间是 A. 5 日

B. 7 日

C. 14 日

D. 20 日

E. 30 日

答案: C

341. 胆道术后病人在 T 管拔管前, 下列护理措施必不可少的是

A. 无菌盐水冲洗

B. B 超

C. 抗生素

D. 试验性夹管 1~2 日

E. 检查血胆红素

答案: D

342. Charcot 三联征表现是

A. 腹痛、畏寒发热、呕吐

B. 腹痛、黄疸、胆囊肿大

C. 腹痛、寒战高热、黄疸

D. 腹痛、寒战高热、低血压

E. 腹痛、黄疸、休克

答案: C

343. 胆总管下端有阻塞时, T 管引出的胆汁为 A. 量过多

B. 量过少, 色深

C. 浑浊

D. 量少而色淡,

E. 棕色稠厚而清

答案: A

344. 一女性患者, 起病急骤, 剑突下阵发性绞痛, 伴有寒、高热, 并出现黄疸, 右腹压痛及肌紧张, 首先应考虑

A. 急性胆囊炎

B. 急性胰腺炎

C. 胆囊结石

D. 胆道蛔虫

E. 胆总管结石

答案: E

345. 男病人，行胆总管切开取石、T 管引流术。术后第 3 日，护士查房时发现 r 管无胆汁流出，病人诉腹痛。首先应

- A. 用无菌生理盐水冲洗 T 管
- B. 检查 T 管是否受压扭曲
- C. 用注射器抽吸 T 管
- D. 准备 T 管造影.
- E. 继续观察，暂不处理

答案：B

346. 老年病人，因寒战、高热、咳嗽 1 日而入院。诊断为肺炎球菌肺炎，次日体温骤降，伴四肢厥冷、 大汗及意识模糊，血压 10.7/7.3kPa(80/65mmHg)，下列哪项护理措施不妥

- A. 去枕平卧，头部抬高 15°
- B. 热水袋保暖
- C. 迅速建立静脉通路
- D. 快速滴入低分子右旋糖酐
- E. 高流量吸氧

答案：B

347. 患儿，7 岁。发热、咳嗽 6 日，T38° C，呼吸 24 次 1 分，肺部有少细湿啰音，痰液黏稠，不易咳出，该患儿的主要护理措施是

- A. 立即物理降温
- B. 给予适量止咳药
- C. 室内湿度应保持 40%
- D. 嘱患儿勿进食过饱
- E. 定时雾化吸入、排痰

答案：E

348. 男婴，8 个月。因发热、咳嗽 2 日，气急 1 日来 诊。检查： T 39.8℃，呼吸 60 次分，脉搏 158 次/分，鼻翼扇动，两肺下部可闻中细湿啰音，肝肋下未及，诊断应首先考虑

- A. 急性支气管炎
- B. 喘息性支气管炎
- C. 支气管肺炎
- D. 急性毛细支气管炎
- E. 腺病毒肺炎

答案：C

349. 患儿，4 个月，支气管肺炎。突然烦躁不安，呼吸急促，三凹征明显。心率 188 次/分，心音低钝，肝肋下 4cm。该患儿可能并发了

- A. 急性心力衰竭

B. 感染性心内膜炎

C. 肺不张

D. 脓胸、脓气胸

E. 肺大疱

答案: A

350. 患儿, 3 个月, 急性支气管肺炎。1 周来高热持续不退, 咳嗽加重, 呼吸困难伴口唇发绀。左侧肋间隙饱满, 呼吸运动减弱, 叩诊呈浊音, 听诊呼吸音减弱。该患儿可能并发了

A. 心力衰竭

B. 呼吸衰竭

C. 脓胸

D. 气胸

E. 肺大疱

答案: C

351. 男性, 66 岁。慢性咳嗽、咳痰 10 多年, 近 1 周来有高热(39℃), 咳痰黏稠呈砖红色, 胶冻状伴气急、发绀、谵妄, 最可能的诊断是

A. 浸润性肺结核

B. 病毒性肺炎

C. 肺脓肿

D. 肺炎球菌肺炎

E. 肺炎杆菌肺炎

答案: E

352. 6 个月支气管肺炎患儿, 突然出现烦躁, 哭闹。面色苍白, 呼吸 68 次/分, 心音低钝, 心率 172 次/分, 肝肋下 2.5cm, 体温 37.6℃, 此时最有效的治疗是

A. 少量输血或血浆

B. 应用镇静剂

C. 吸氧

D. 应用快速洋地黄制剂

E. 应用利尿剂

答案: D

353. 4 个月支气管肺炎患儿, 体温 40℃, 两眼上翻, 惊厥, 昏迷, 前囟张力增高。提示出现

A. 心力衰竭

B. 高热惊厥

C. 中毒性脑病

D. 婴儿手足搐搦症

E. 低血糖

答案: C

354. 男婴, 6 个月, 发热、咳嗽 2 日, 呼吸困难 1 日, 双肺有较多哮鸣音, 胸片示肺气肿, 诊断为毛细支气管炎, 病原体主要是

A. 呼吸道合胞病毒

B. 腺病毒

C. 流感病毒

D. 肺炎支原体

E. 柯萨奇病毒

答案: A

355. 1 岁男婴, 发热、咳嗽 1 周, 查体发现皮肤有猩红热样皮疹, 呼吸急促, 两肺中、细湿啰音, 右肺背部叩诊稍浊, 心率 135 次/分, 律齐, 肝右肋下 1cm, 白细胞 $19 \times 10^9/L$, 中性粒细胞 0.75, 淋巴细胞 0.25, 最可能的诊断是

A. 腺病毒性肺炎

B. 金黄色葡萄球菌肺炎

C. 支原体肺炎

D. 革兰阴性杆菌肺炎

E. 毛细支气管肺炎

答案: B

356. 男患儿, 8 岁。1 周末发热、咳嗽, 2 日来加重。曾用青霉素 3 日无效。查体: 体温 $38^{\circ}C$ 。右后下肺呼吸音减低, 胸片发现左上肺小片状淡薄云絮状阴影。该患儿应考虑为

A. 呼吸道合胞病毒肺炎 B. 肺炎 支原体肺炎 C. 大叶性肺炎

D. 金黄色葡萄球菌肺炎

E. 腺病毒肺炎

答案: B

357. 哮喘持续状态的错误处理是

A 去除诱因

B. 保持呼吸道通畅

c 高流量吸氧

D. 纠正脱水

E. 控制感染

答案: C

358. 为防止哮喘病人痰液黏稠不易咳出, 应采取

体位引流

B. 低盐饮食

- C. 多饮水
- D. 持续吸氧
- E 翻身、拍背

答案: C

359. 护理重症哮喘病人, 哪项不正确

- A. 取坐位或半卧位
- B. 勿使勉强进食
- C. 限制水、钠摄入
- D. 给予低流量吸氧
- E. 痰多黏稠者采用雾化吸入

答案: C

360. 糖皮质激素用于治疗哮喘的主要作用是 A. 降低痰液黏稠度

- B. 抑制气道炎症反应
- C. 舒张支气管平滑肌
- D. 抑制咳嗽中枢
- E. 兴奋呼吸中枢

答案: C

361. 某支气管哮喘病人, 每当发作就自用沙丁胺醇(舒喘灵)喷雾吸入, 护士应告诫病人, 如用量过大可能会出现

- A 心动过缓, 腹泻
- B. 食欲减退, 恶心呕吐
- C. 血压升高, 心动过速
- D. 皮疹, 发热
- E. 肝、肾功能异常

答案: C

362. 某哮喘病人, 呼吸极度困难, 一口气不能说完一句话, 伴发绀、大汗淋漓。对该病人首先必须 A. 专人护理, 准备抢救用品

- B. 加强巡视, 防止情绪激动
- C. 帮助口服平喘药物
- D. 避免进食可能诱发哮喘的食物
- E. 采血做血气分析

答案: A

363. 男性, 18 岁。自 9 岁起反复出现发作性呼吸困难, 发作前常有喷嚏、流涕, 症状持续 10 分钟后可自然缓解, 缓解后无任何不适, 最可能的诊断是

A. 心源性哮喘

B. 过敏性肺炎

C. 支气管哮喘

D. 自发性气胸

E. 慢性喘息型支气管炎

答案: C

364. 女性, 32 岁。20 多年来发作性气喘, 春、夏季发作较重, 4 小时前发病。查体: 两肺叩诊. 清音, 有广泛哮鸣音, 心率 100 次/分, 律整, 血 WBC 10×10^9 /L、中性 70%、嗜酸性粒细胞 8%。胸部 X 线: 两肺透亮度增加。最可能的诊断为

A. 慢性喘息型支气管炎

B. 支气管哮喘

C. 弥漫性肺间质纤维化

D. 心源性哮喘

E. 变态反应性肺曲菌病

答案: B

365. 男性, 42 岁。突然发作喘息, 原因不清, 紧急处理时应首先选哪种药物

A. 毒毛花苷 K 0.25mg 静脉注射

B. 吗啡 10mg 肌内注射

C. 氨茶碱 0.25g 静脉注射

D. 0.1%肾上腺素 0.5ml 皮下注射

E. 吸入异丙肾上腺素气雾剂

答案: C

366. 女性, 48 岁。哮喘持续发作, 呼吸 36 次/分, 吸气时脉搏明显减弱, 此时该病人的脉搏属于

A. 奇脉

B. 短绌脉

C. 洪脉

D. 交替脉

E. 水冲脉

答案: A

367. 男性, 16 岁。因支气管哮喘发作入院, 听诊可闻及 A. 两肺满布湿啰音

B. 两肺满布哮鸣音

C. 一侧满布湿啰音

D. 一侧满布哮鸣音

E. 两肺底满布干湿啰音

答案: B

368. 男性, 48 岁。受凉后哮喘发作, 2 日来呼吸困难加重, 皮肤潮红, 多汁, 眼球结膜水肿, 应给其的吸氧方式是

- A. 高流量持续吸氧
- B. 高流量间歇吸氧
- C. 低流量持续吸氧
- D. 低流量间歇吸氧
- E. 酒精湿化吸氧

答案: C

369. 开放性气胸的病理生理改变可有

- A 吸气时纵隔向患侧移位
- B. 不发生休克
- C 呼气时纵隔向健侧偏移
- D. 纵隔随呼吸来回摆动
- E. 胸壁软化

答案: D

闭合性气胸胸膜腔内压力变化正确的是

- A. 胸膜腔内压力持续升高
- B. 胸膜腔内压抽气后压力维持不变
- C 胸膜腔内压力明显超过大气压
- D. 抽气后, 胸膜腔内压力下降不复升
- E. 抽气后胸膜腔内压力下降, 但有迅速回升

答案: D

371. 开放性气胸的典型症状是

- A. 患侧胸部凹陷
- B. 呼吸困难
- C. 胸壁有伤口
- D. 纵隔移位
- E. 发绀

答案: C

372. 自发性气胸最早症状是

- A. 呕吐
- B. 心悸

C. 发热

D. 胸痛

E. 咳嗽

答案: D

373. 开放性气胸病人呼吸困难最主要的急救措施是
吸氧

B. 输血补液

C. 气管插管行辅助呼吸

D. 立即剖胸探查

E. 迅速封闭胸部伤口

答案: E

374 张力性气胸时首要的急救处理措施是 A. 气管插管辅助呼吸

B. 输血、补液抗休克

C. 立即排气, 降低胸膜腔内压力

D. 剖胸探查

E. 气管切开辅助呼吸

答案: C

375. 气胸病人闭式胸膜腔引流的装置, 错误的是
锁骨中线第 2 肋间插管

B. 长玻璃管口在水面下 3cm

C. 短玻璃管与大气相通

D. 整个装置均需密闭

E. 水封瓶距离引流口 30cm

答案: E

376. 外伤性血胸最简便可靠的诊断依据是

A. 呼吸困难、发绀

B. 气管移位

C. 胸部 X 线检查见有液平面

D. 胸穿抽出血液和气体

E. 胸部超声探查见有液平面

答案: D

377. 以下与进行性血胸有关的是

A. 反常呼吸运动

B. 胸膜腔压力不断增高

C. 纵隔扑动

D. 静脉压力增高，动脉压降低.

E. 胸腔引流出血液>200m/h, 持续 3 小时

答案: E

378. 外伤性血气胸开胸止血术后需要

A. 胸膜腔穿刺抽气

B. 闭式胸膜腔引流.

C. 剖胸手术

D. 观察呼吸变化

E. 迅速胸膜腔减压

答案: B

379. 胸腔闭式引流拔管时，应嘱病人

A. 深吸气后屏气

B. 深呼气后屏气

C. 正常呼吸

D. 浅呼气后屏气

E. 浅吸气后屏气

答案: A

380. 男性，36 岁。刀刺伤后半小时入院，病人神志清楚、气促、呼吸困难，查体可见胸壁上有开放性伤口，随呼吸发出“嘶嘶”声，伤侧胸部叩诊呈鼓音，听诊呼吸音减弱，气管向健侧移位。该病人紧急处理应为

A. 立即用无菌敷料封闭伤口

B. 在伤侧第二肋间锁骨中线插粗针排气

C. 行胸腔穿刺

D. 行胸腔闭式引流术

E. 行开胸探查术

答案: A

381. 男性，40 岁。因气胸行胸膜腔闭式引流时，发现胸瓶长玻璃管内水柱无波动，嘱病人做深呼吸后，水柱仍无波动，提示

A. 胸膜腔内负压尚未恢复

B. 胸膜腔内负压已恢复

C. 胸膜腔内负压过大

D. 胸膜腔内负压过小

E. 引流管阻塞

答案: E

382. 有关妊娠各周胎儿发育的特征下述哪项异常

孕 8 周末 B 超检查有胎心搏动

B. 孕 16 周末超声波检查可辨胎儿性别

C. 20 周末木质胎心听筒可听到胎心

D. 36 周末生活能力差, 娩出不能存活

E. 40 周发育成熟, 具备成熟儿各种特点

答案: D

383. 下述哪种先露最多见

A. 枕先露

B. 肩先露

C. 臀先露

D. 面先露

E. 足先露

答案: A

384. 关于子宫峡部变化, 下述错误的为

A. 非孕期长仅 1cm

B. 妊娠后逐渐伸长变宽

C. 妊娠后期形成子宫下段

D. 临产时可达 15 ~ 22cm

E. 分娩时是软产道的一部分

答案: D

385. 关于妊娠期母体变化, 下列哪项不对 A. 妊娠 32~34 周血容量增加达高峰 B. 妊娠晚期易发生外阴及下肢静脉曲张 C. 子宫峡部在妊娠后期形成子宫下段

D. 妊娠末期孕妇血液处于低凝状态

E. 妊娠后卵巢不排卵

答案: D

386. 关于早期妊娠的体征, 下述正确的是 A. 子宫呈球形增大变硬

B. 乳房增大, 乳头和乳晕不着色。

C. 可闻及胎心音

D. 可触及胎儿肢体

E. 妇检时宫颈和宫体可出现黑加征

答案: E

387. 下列哪项可确诊早孕

- A. 停经
- B. 恶心、呕吐
- C. 乳房增大
- D. 子宫增大
- E. B 超显示胎心搏动

答案: E

388. 妊娠试验“阳性”，是因为孕妇的血、尿中含有 A. 雌激素

- B. 孕激素
- C. 胎盘生乳素
- D. 抑制免疫物质
- E. 绒毛膜促性腺激素

答案: E

389. B 超检查可见胎心搏动的孕周为

- A. 8 周末起
- B. 12 周末起
- C. 16 周末起
- D. 20 周末起
- E. 24 周末起

答案: A

390. 妊娠 30 周，骶左前位。胎心音的听诊部位应在
脐下左侧

- B. 脐下右侧
- C 脐上右侧
- D. 脐上左侧
- E. 脐周

答案: D

391. 胎体纵轴与母体纵轴的关系

- A. 胎方位
- B. 胎产式
- C. 头盆关系
- D. 枕先露与骨盆的关系
- E. 臀先露与骨盆的关系

答案: B

392. 运用四步触诊法主要检查

- A. 子宫大小，胎产式
- B. 子宫大小，胎方位.
- C. 胎儿大小，先露情况及胎位等
- D. 子宫大小及子宫肌的敏感程度
- E 羊水的多少、胎产式及胎方位

答案: C

393. 关于四步触诊哪项不对

- A. 前三步，检查者均面向孕妇头部
- B. 第四步面向孕妇足部
- C. 第二步触诊主要查胎背四肢各在何侧
- D 第三步主要检查先露大小
- E. 第四步主要了解先露部入盆程度

答案: D

394. 下列不是妊娠期间常见症状的是

- A. 贫血
- B. 便秘.
- C. 恶心
- D. 高血压
- E. 下肢水肿

答案: D

395. 在孕妇腹壁最早听到胎心音的时间约是 A. 孕 8 周末

- B. 孕 12 周末
- C. 孕 16 周末
- D. 孕 20 周末
- E. 孕 24 周末

答案: D

396. 女性，28 岁。新婚。平时月经规律，现停经 42 日，体温 37.4℃，主诉晨起恶心、呕吐、并有尿频的表现。考虑最大可能为

- A. 上感
- B. 早孕
- C. 急性胃炎
- D. 尿道感染

E. 月经失调

答案: B

397. 孕妇末次月经为 2004 年 5 月 8 日, 预产期是 A. 2005 年 3 月 16 日

B. 2005 年 4 月 15 日

C. 2005 年 2 月 15 日

D. 2005 年 5 月 15 日

E. 2005 年 6 月 18 日

答案: C

398. 影响分娩的因素是

A. 子宫收缩力、骨盆、胎位及精神心理因素

B. 子宫收缩力、骨盆、胎位及胎儿大小

C. 子宫收缩力、骨盆、胎儿及产程进展情况

D. 产力、产道、胎儿及精神心理因素

E. 产力、产道、胎儿及产程进展情况

答案: D

399. 分娩的主力是

A. 产妇向下屏气力量

B. 膈肌收缩力

C. 腹肌收缩力

D. 子宫收缩力

E. 肛提肌收缩力

答案: D

400. 产妇的软产道不包括

A. 子宫上段

B. 子宫下段

C. 子宫颈

D. 阴道

E. 骨盆底软组织

答案: A

401. 给孕妇做 B 超检查时, 以哪一个径线的值判断胎儿的大小

A. 枕额径

B. 枕颏径

- C. 双顶径
- D. 枕下前囟径
- E. 双颞径

答案: C

402. F 列哪种分娩机制贯穿于分娩的全过程中 A. 衔接

- B. 下降
- C. 俯屈
- D. 内旋转
- E. 外旋转

答案: B

403. 在正常分娩中, 哪项动作可以使胎头矢状缝转变为与中骨盆及骨盆出口前后径一致

- A. 外旋转
- B. 内旋转
- C. 仰伸
- D. 俯屈
- E. 衔接

答案: B

404. 左枕前位时, 胎头娩出后的第一个动作是. A. 衔接)

- B. 仰伸
- C. 俯屈
- D. 复位
- E. 外旋转

答案: D

405. 分娩比较可靠的征兆是

- A. 规律宫缩
- B. 不规律宫缩
- C. 见红
- D. 宫口开大
- E. 阴道分泌物增加

答案: C

406. 临产的主要标志是

- A. 胎膜早破
- B. 阴道流血

C. 不规律子宫收缩

D. 规律的子宫收缩

E. 腹痛

答案: D

407. 临产观察先露下降程度的标志是

A. 耻骨弓

B. 骶尾关节

C. 坐骨结节水平

D. 坐骨棘水平

E. 骶骨岬

答案: D

408. 乳喂养时, 指导产妇预防乳头皲裂的主要措施是

哺乳前柔和的按摩乳房, 刺激排乳反射

哺乳前用酒精消毒乳房

C. 哺乳后用肥皂清洁乳房

D. 保持正确的喂养姿势

E. 指导产妇和婴儿早接触, 早喂养

答案: D

409. 产后擦洗外阴常用的药液是

A. 1: 5000 的高锰酸钾溶液或 1: 1000 苯扎溴铵液

B. 生理盐水

C. 5%碘伏

D. 70%乙醇

E. 50%硫酸镁液

答案:A

410. 产后会阴护理, 错误的是

A. 每日常规 1 次, 临睡前进行

B. 有伤口者伤口部位应单独擦洗

C. 擦洗的顺序是从上到下

D. 水肿者用 75%酒精湿热敷

E. 大便后用水清洗, 保持会阴部清洁

答案: D

411. 下列哪项不属于产后早期活动的益处

- A. 利于子宫复旧
- B. 利于恶露排出
- C. 促进盆底肌肉张力恢复
- D. 防止子宫脱垂
- E. 防止静脉血栓形成

答案: D

412. 为搞好母婴保健, 产后复查的时间是

- A. 产后半个月
- B. 产后 1 个月
- C. 产后 2 个月
- D. 产后 42 日
- E. 产后 56 日

答案: D

413. 促进乳汁分泌最佳的护理是

- A. 让婴儿多吸吮
- B. 注射前列腺素
- C. 使用大量的雌激素制剂
- D. 使用大量的孕激素制剂
- E. 以上都不是

答案: A

414. 初产妇, 顺产, 产后第 14 日子宫复旧情况, 哪项不正常

- A. 耻骨联合上方扪及宫底
- B. 白色恶露
- C. 宫颈内口关闭
- D. 子宫颈外口呈“一”形
- E. 子宫内膜尚未充分修复

答案: A

415. 某产妇, 产后 8 小时, 产妇仍不能自行排尿, 曾底脐上, 宫底下方扪及囊性包块, 表明有床尿滞留。下列处理哪项不妥

- A. 帮助其下床排尿
- B. 用温水冲洗会阴部
- C. 让产妇听流水声
- D. 肌内注射新斯的明 0.5mg

E. 首先导尿

答案: E

416. 女性, 25 岁。妊娠 39 周, 于 2: 30 正常分娩, 6. 40 病人主诉下腹胀、痛。视诊: 下腹膀胱区隆起。叩诊: 耻骨联合上鼓音。病人存在的健康问题是

分娩后疼痛

B. 体液过多

C. 排尿异常

D. 尿潴留

E. 有子宫内膜感染的可能

答案: D

417. 女性, 26 岁。初产妇, 足月妊娠, 行会阴侧切分娩。产后第 2 日, 会阴伤口水肿明显, 局部无分泌物和压痛。护理措施错误的是

A. 保持外阴清洁干燥

B. 0. 1 %苯扎溴铵(新洁尔灭)溶液擦洗

C. 50 %硫酸镁溶液湿热敷

D. 1: 5000 高锰酸钾溶液坐浴

E 局部红外线照射

答案: C

418. 初产妇, 剖宫后乳汁少, 以下鼓励母乳喂养的措施中, 哪项不对

A. 母婴同室

B. 多进营养丰富的汤汁饮食

C. 两次哺乳间给婴儿加少量糖水

D. 增加哺乳次数

E. 精神愉快、睡眠充足

答案: C

419. 某产妇, 产后第 4 日一侧乳房胀痛, 低热, 下 9 处理哪项不妥

A. 减少哺乳次数

B. 两次哺乳期间, 冷敷乳房, 减少充血 C. 口服散结通乳中药

D. 热敷患侧乳房

E. 用吸奶器吸净余奶

答案: A

二、判断题

1、入院时间应该用蓝色钢笔纵向填写再体温单 40-42 ℃ 的表格内。

答案：错误

2、垂直压力是压疮发生的重要原因。

答案：正确

3、口腔护理时,义齿取下后放入酒精内保存。

答案：错误

4、病室的湿度以 60 %-70 %为宜。

答案：错误

5、橡胶制品采用煮沸消毒时应在水沸后放入。

答案：正确

6、结核菌素试验阴性说明机体未感染结核菌。

答案：错误

7、慢性肾炎大多数由急性肾炎迁延不愈发展而来。

答案：错误

8、饮食护理是糖尿病病人最基本的治疗措施。

答案：正确

9、肛门坐浴用 1:5000 的高锰酸钾溶液 3000ml。

答案：正确

10、高级生命支持是对心脏骤停的病人实施的生命支持技术。

答案：错误

11、新生儿和老年人室温应保持在 18-22 ℃。

答案：错误

12、为女性患者导尿时插入深度 4-6cm,见尿后再插入 1-2cm。

答案：正确

13、为了提高亚急性细菌性心内膜炎的检出率,其血培养标本采血量为 5ml。

答案：错误

14、肛管排气时肛管保留时间不超过 1 小时。

答案：错误

15、煮沸消毒前物品必须刷洗干净。

答案：正确

16、预防尿酸性肾病的发生要求患者少饮水。

答案：错误

17、急性白血病经过治疗后转为慢性白血病。

答案：错误

18、胃镜检查是目前诊断胃癌的可靠方法。

答案：正确

19、泌尿系损伤时血尿程度与损伤程度成正比。

答案：错误

20、敌百虫中毒时禁用碳酸氢钠洗胃。

答案：正确

21、玻璃器皿采用煮沸消毒时应在冷水时放入。

答案：正确

22、对于一般病人合适的室温是 15-18 ℃。

答案：错误

23、吸痰时每次抽吸时间不得少于 20 秒。

答案：错误

24、临时备用医嘱有效期为 24 小时。

答案：错误

25、死亡过程中最后丧失的感官为听觉。

答案：正确

26、“三多一少”是糖尿病病人必有的典型症状。

答案：错误

27、发作性胸痛是心绞痛病人的主要临床表现。

答案：正确

28、上消化道出血是门静脉高压症的最突出表现。

答案：错误

29、高压氧治疗减压时,让病人屏气,以免造成严重的肺气压伤。

答案：错误

30、皮肤吸收毒物一般较快,当皮肤有破损时更利于吸收。

答案：错误

31、妇产科护理范畴包括儿童保健。

答案：错误

32、会阴湿热敷的温度应为 41-48℃。

答案：正确

33、妊娠合并心脏病以先天性心脏病多见。

答案：正确

34、宫颈或颈管活体组织检查可确定宫颈病变性质,是确诊宫颈癌的主要方法。

答案：正确

35、子宫内膜癌好发于子宫体部。

答案：错误

36、侵蚀性葡萄胎多发生在葡萄胎清除后 12 个月内。

答案：错误

37、功血可发生于月经初潮至绝经的任何年龄妇女。

答案：正确

38、行会阴擦/冲洗时,护理人员应清洗双手,并注意先擦/冲洗伤口有感染的病人。

答案：错误

39、胎头宫缩时暴露于阴道口,当宫缩间歇时又缩回阴道内,称为胎头着冠。

答案：错误

40、吸吮反射、吞咽反射、觅食反射是一出生即存在并永久保持的反射。

答案：错误

41、臀位在妊娠 30 周前可采用胸膝卧位方法予以纠正。

答案：错误

42、宫缩以子宫体部最强最持久,向下逐渐减弱。

答案：错误

43、脐静脉带有来自胎儿氧含量较低的混合血。

答案：错误

44、焦虑时,去甲肾上腺素减少可使子宫收缩力减弱,而对疼痛的敏感性减轻。

答案：错误

45、不协调性宫缩乏力的处理原则是调节宫缩,恢复宫缩极性。

答案：正确

46、除甲型病毒性肝炎外,其他四种类型的病毒性肝炎均存在母婴传播。

答案：正确

47、卵巢肿瘤放腹水每次不超过 1000ml。

答案：错误

48、骨盆是由骶骨、尾骨和左右两块髋骨构成。

答案：正确

49、葡萄胎刮宫术中如有大量出血,应立即配血。

答案：错误

50、孕激素可促使子宫发育、肌层增厚。

答案：错误

51、输卵管妊娠破裂前,妇科检查子宫颈有触痛。

答案：错误

52、临产的标志是规律性宫缩, 宫颈口扩张, 胎先露下降。

答案: 正确

53、指导病人用药时应告知助消化药饭前服用。

答案: 错误

54、妊娠期孕妇的血容量逐渐增加约 35%, 于妊娠 32-34 周达高峰。

答案: 正确

55、羊水能通过形成前羊水囊, 而加速产程的进展。

答案: 正确

56、胎儿娩出 1h 后, 胎盘尚未娩出者称胎盘滞留。

答案: 错误

57、有排卵的月经周期的妇女基础体温呈单相型。

答案: 错误

58、衔接是指胎头双顶径进入骨盆入口平面, 胎头颅骨最低点接近或达到坐骨结节水平。

答案: 错误

59、初产妇胎头衔接的时间一般在分娩前 24-48 小时。

答案: 错误

60、足月胎儿脐带平均长约 50cm, 内有 1 条脐动脉 2 条脐静脉。

答案: 错误

61、规律的宫缩是指持续 30 秒或以上, 间歇 5-6 分钟的宫缩。

答案: 错误

62、产妇在产后 10 天后在腹部扪不到宫底。

答案: 正确

63、输卵管妊娠破裂的特征性体征是阴道后穹窿饱满, 宫颈举痛阳性。

答案: 正确

64、用硫酸镁治疗妊娠期高血压疾病时, 最早出现的中毒反应是呼吸减慢。

答案: 错误

65、测孕妇血压时, 较基础血压高 30/15mmHg 或大于 140/90mmHg 提示异常。

答案: 正确

66、妊娠合并心脏病的孕妇, 分娩后不宜使用的止血药维生素 K1。

答案: 错误

67、协调性子宫收缩过强可出现子宫痉挛性狭窄环。

答案: 错误

68、子宫收缩乏力可导致产后出血。

答案: 正确

69、产道异常可导致围生儿发生颅内出血。

答案：正确

70、子宫肌瘤是女性生殖器良性肿瘤,好发于绝经妇女。

答案：错误

三、多选

1、哪些病人可采用测量肛温方法：

- A、 昏迷病人
- B、 小儿
- C、 腹泻患者
- D、 心梗病人

答案：AB

2、常用静脉注射的部位是：

- A、 四肢浅静脉
- B、 股静脉
- C、 小儿头皮静脉
- D、 成人头皮静脉

答案：ABC

3、静脉输液目的是：

- A、 补充水和电解质
- B、 纠正血容量不足
- C、 补充营养和热量
- D、 输入药物控制感染

答案：ABCD

4、以下哪种呼吸属于节律异常：

- A、 浅快呼吸
- B、 蝉鸣呼吸
- C、 陈施呼吸
- D、 比奥呼吸

答案：CD

5、洗胃的目的是：

- A、 解除病人精神紧张
- B、 减轻毒物吸收
- C、 胃镜检查前准备
- D、 减轻胃粘膜水肿

答案：BCD

6、医院基本膳食包括：

- A、 普通饮食
- B、 软质饮食
- C、 半流质饮食

D、 流质饮食

答案：ABCD

7、下列哪些病人不适宜应用洋地黄制剂：

A、 肥厚型心肌病的病人

B、 心房颤动心室率快的病人

C、 病态窦房结综合征病人

D、 急性心肌梗死 24 小时内伴心力衰竭的病人

答案：ACD

8、神经系统疾病下列哪些头部位置会使颅内压升高：

A、 头部抬高 60°

B、 头部低于 10°

C、 头部抬高 10-30°

D、 颈部扭曲

答案：BD

9、阿托品化表现症状正确的是：

A、 皮肤干燥、紫红

B、 体温正常或轻度升高

C、 瞳孔明显扩大不再缩小

D、 心率增快

答案：BC

10、气管切开术与环甲膜切开术共有的并发症是：

A、 局部蜂窝组织炎

B、 出血

C、 气管-食管瘘

D、 纵膈气肿

答案：BD

11、为昏迷病人插胃管时为提高成功率, 下列说法正确的是：

A、 插管前让病人去枕平卧位

B、 协助病人头向后仰

C、 当胃管插入 15 CM 处要托起病人头部使下颌靠近胸骨柄

D、 边插胃管边抽吸胃液并将胃管插至所需长度

答案：ABC

12、哪些病人可采用测量口温方法：

A、 昏迷病人

B、 精神障碍患者

C、 下肢损伤患者

D、 心梗病人

答案：CD

13、下列哪些符合脉搏生理变化：

- A、 成人比小儿快
- B、 老人比小儿快
- C、 女性比男性快
- D、 活动时快

答案: CD

14、静脉输血适应症是:

- A、 严重感染
- B、 低蛋白血症
- C、 造血功能障碍
- D、 休克

答案: ABCD

15、取咽部分泌物的培养标本时应:

- A、 患者先用漱口液漱口
- B、 反复擦拭用力
- C、 用无菌长棉签蘸等渗盐水擦取咽部分泌物
- D、 写明采集标本时间

答案: CD

16、58 岁男性,急性心肌梗死患者,发病 5 天来一直绝对卧床治疗,自诉便秘,近 3 天来未排便,下列哪些护理措施是错误的:

- A、 绝对卧床休息,建议卧床排便
- B、 给予 500mL 以上肥皂水灌肠
- C、 给予口服 50-100mL 液状石蜡
- D、 戴手套从其肛门挖出粪块

答案: BC

17、支气管哮喘的诱发因素正确的是:

- A、 吸入性变应原
- B、 感染
- C、 食物中缺乏维生素 A
- D、 气候改变

答案: ABD

18、下列关于帕金森患者震颤的描述,正确的是:

- A、 睡眠中消失
- B、 运动时加重
- C、 安静时明显
- D、 多为首发症状

答案: ACD

19、紧急针头胸腔穿刺减压的并发症是:

- A、 穿刺部位血肿
- B、 膈肌破裂
- C、 空气栓塞

D、 心律失常

答案：AB

20、属于Ⅱ度冻伤临床表现的是：

A、 局部有感觉异常及刺痛

B、 皮肤水肿伴明显不适感

C、 皮肤紫红、有轻度肿胀

D、 皮肤和皮下组织有轻度坏死

答案：BD

21、下列哪种病人服药时需将药碾碎溶解后服用：

A、 鼻饲病人

B、 发热病人

C、 腹泻病人

D、 上消化道大出血病人

答案：AD

22、毒物不明的病人洗胃液常选择：

A、 5 % 醋酸

B、 等渗盐水

C、 牛奶

D、 温开水

答案：BD

23、关于药瓶标签,下述错误的是：

A、 内服药标签为红色边

B、 内服药标签为蓝色边

C、 外用药标签为蓝色边

D、 剧毒药标签为红色边

答案：ACD

24、咽拭子培养时取分泌物的位置是：

A、 咽腭弓

B、 舌腭弓

C、 舌尖

D、 扁桃体

答案：ABD

25、病人出现三凹症,吸气费力,吸气时间明显延长可能患何种疾病：

A、 阻塞性肺气肿

B、 气管异物

C、 胸腔积液

D、 喉头水肿

答案：BD

26、急性胰腺炎的饮食护理措施中正确的是：

- A、 严格禁食,少量饮水
- B、 轻型患者可给予低糖流质饮食
- C、 腹胀明显者给予胃肠减压
- D、 恢复正常饮食后以少量多餐、低脂饮食为宜

答案: CD

27、下列关于甲状腺功能亢进症的护理措施正确的是:

- A、 室温保持在 28 ℃左右
- B、 给予高纤维素饮食
- C、 突眼者外出应戴茶色眼镜
- D、 患者出现高热、咽痛应警惕粒细胞缺乏症

答案: CD

28、感染过程中病原体的致病力包括:

- A、 侵袭力
- B、 毒力
- C、 数量
- D、 变异性

答案: ABCD

29、肝硬化内分泌失调的表现有:

- A、 营养障碍
- B、 蜘蛛痣
- C、 男性乳房发育
- D、 肝掌

答案: BCD

30、灾难检验伤分类场所应选择:

- A、 伤员相对分散的区域
- B、 远离污染环境的下风向场地
- C、 远离危险源的安全场所
- D、 免受气候条件影响的地方

答案: CD